Size: 285 X 210mm

CONVAY

Insecticide

CARTAP HYDROCHLORIDE 7.5 % + CHLORANTRANILIPROLE 0.4 % GR

It is used to control Yellow stem borer Leaf folder and Whorl maggot in Paddy.

CHEMICAL COMPOSITION:

Components		Content (% w/w)
Cartap hydrochloride a.i.	:	07.50
Chlorantraniliprole a.i.	:	00.40
Phosphoric acid	:	00.35
Phosphate ester of alcohol	:	01.50
Alcohol alkoxylate	:	02.50
China clay	:	04.30
River sand	:	QS
Total	:	**100.00**

Recommendation:

Name of the Crop	Common Name of the target pest	Waiting period from last spray to harvest (in days)	Active Ingredients (gm)	Formu-lation (ml)	Dilution in water (L)
Paddy	Yellow stem borer, Leaf folder and Whorl maggot	59	691.25	8750	NA

Directions for use: The recommended dosage of Cartap Hydrochloride 7.5 % + Chlorantraniliprole 0.4 % GR should be broadcasted uniformly mixing in sand @ 50 kg/ ha.

Weather conditions (in general): Not to be used during unfavorable conditions.

Soil and water (wherever applicable): Light to heavy soil.

Crop stage for application : Days after showing- Vegetative to Reproductive stage.

Application techniques: Broadcasting of granules mixing in sand.

Equipment Type: Hand operated granule applicator, mechanical dispenser or hand wearing rubber gloves.

Nozzle Type: Not applicable.

Dosage: Refer to the above recommendation.

Instruction for Mixing: The recommended dosage of Cartap Hydrochloride 7.5 % + Chlorantraniliprole 0.4 % GR should be broadcasted uniformly mixing in sand @ 50 kg/ ha.

Re-entry period: 24 hrs

Pre Harvest Interval (PHI): Refer to the above recommendation.

Manner and Time of application: Broadcasting, it should be applied preferably in the morning or evening hours.

Application timings: Cartap Hydrochloride 7.5 % + Chlorantraniliprole 0.4 % GR is to be applied at the time of pest incidence in the field.

Frequency including maximum number of sprays : Single application.

Stages during which pesticides should not be applied on any crop : Refer to the above recommendation.

Precautions to be taken to avoid harm to the beneficial insects like honey bees and natural enemies of pests : The product is very toxic to fish and aquatic organisms and honey bees, thus its uses in and around aquaculture and during active foraging period of bees should be avoided.

Symptoms of poisoning: Lethargy, nasal secretion, cloudy eyes, nausea, salivation, spasms, dyspnoea and mydriasis may occur.

First aid : 1. If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician.

2. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth-to-mouth breathing. Consult a physician. **3. In case of skin contact** : Wash thoroughly the affected part of the body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persist, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use.

4.In case of eye contact : Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persist, Consult eye specialist.

Antidote Statement: No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Safety Precautions: 1. The spray man should use appropriate protective clothing like hat, long sleeved shirt, long pants and shoes. 2. Avoid contact with eyes and skin when handling the concentrates spray solution. Avoid inhalation of spray mist. Wash thoroughly with soap and water after handling. Do not eat, drink or smoke during application. 3. Remove contaminated clothes and wash before reuse. Do not reuse the empty containers. 4. Wash hands & exposed skin with soap and water before meals and after work.

Instructions for storage: 1. The packages containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises from the rooms or premises used for storing other article particularly articles of food or shall be kept in separate Almirah under lock and key, depending on the quantity and nature of the insecticide . 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry and well-lit and ventilated and of sufficient dimensions.

Cautionary Statement: 1. Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. 2. Destroy the container after use as directed on leaflet. 3. The product is very toxic to fish and aquatic organisms and honey bees, thus its uses in and around aquaculture and during active foraging period of bees should be avoided.

Disposal of used containers, Washing from equipment and surplus material: 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticide and operators to dispose off Packages or surplus materials and washings in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Marketed by: SWAL CORPORATION LTD.

C/o. UPL LTD., Readymoney Terrace, 167,
Dr. A. B. Road, Worli, Mumbai-400018, Maharashtra.

कॉन्वे

कीटनाशक

कारटाप हाइड्रोक्लोराइड ७.५% + क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल ०.४% जी.आर.

इसका उपयोग धान के तना छेदक, पत्ता बेलनक और गोभ की मक्खी जैसे कीटों की रोकथाम के लिए किया जाता है।

रासायनिक संरचना :

		प्रमाण (% भार/भार)
कारटाप हाइड्रोक्लोराइड स.त.	:	०७.५०
क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल स.त.	:	००.४०
फॉस्फोरिक एसिड	:	००.३५
फॉस्फेट ईस्टर ऑफ अल्कोहोल	:	०१.५०
अल्कोहोल एल्कोक्सीलेट	:	०२.५०
चाइना क्ले	:	०४.३०
रिवर सैंड	:	पर्याप्त मात्रा
कुल	:	**१००.००**

अनुशंसा :

फसल का नाम	लक्ष्य कीट का सामान्य नाम	अंतिम स्प्रे से कटाई तक प्रतीक्षा अवधि (दिनों में)	सक्रिय सामग्री (ग्रा.)	सूत्रीकरण (मिली.)	पानी में पतलापन (ली.)
धान	तना छेदक, पत्ता बेलनक और गोभ की मक्खी	५९	६९१.२५	८७५०	लागू नहीं

इस्तेमाल के लिए निर्देश: कारटाप हाइड्रोक्लोराइड ७.५% + क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल ०.४ % जी.आर. की आवश्यक मात्रा रेत (५० किलो / हेक्टर) में मिलाकर बुरकाव करें।

मौसम की स्थिति (सामान्य रूप में) : प्रतिकूल परिस्थितियों में उपयोग न करें।

मिट्टी और पानी (जहां भी लागू हो): हल्की से भारी मिट्टी।

आवेदन के लिए फसल चरण – दिखाने के बाद के दिन: पौध वृद्धि अवस्था से प्रजनन अवस्था के दौरान।

आवेदन तकनीक: ग्रेनुअल्स को रेत में मिलाकर बुरकाव करें।

उपकरण के प्रकार: हाथ से चलाने वाला ग्रेनुअल्स एप्लिकेटर, मैकेनिकल डिस्पेंसर या हाथ में पहनने के रबर के दस्ताने।

नोजल प्रकार: लागू नहीं।

मात्रा बनाने की विधि: ऊपर दिए गए परामर्श का पालन करें।

मिलाने का निर्देश: कारटाप हाइड्रोक्लोराइड ७.५% + क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल ०.४% जी.आर. की आवश्यक मात्रा रेत (५० किलो/हेक्टर) में मिलाकर बुरकाव करें।

पुन: प्रवेश अवधि: २४ घंटे।

फसल पूर्व अंतराल (पीएचआई): ऊपर दिए गए परामर्श का पालन करें।

आवेदन का तरीका और समय: सुबह और शाम के समय बुरकाव करना ज्यादा बेहतर होता है।

आवेदन का समय: कारटाप हाइड्रोक्लोराइड ७.५% + क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल ०.४% जी.आर. का बुरकाव कीटों के प्रकट होने पर करें।

स्प्रे की अधिकतम संख्या सहित आवृत्ति: एक बुरकाव करें।

ये अवस्थाएं जिनके दौरान किसी भी फसल पर कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए: ऊपर दिए गए परामर्श का पालन करें।

मधु मक्खियों और कीटों के प्राकृतिक शत्रु जैसे लाभकारी कीड़ों को नुकसान से बचाने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां: यह उत्पाद मछली, जलीय जीवों और मधु मक्खियों के लिए बहुत जहरीला है, इसलिए जलीय कृषि में और उसके आसपास और मधुमक्खियों की सक्रिय भोजन की अवधि के दौरान इसके उपयोग से बचना चाहिए।

विषाक्तता के लक्षण: नींद आना, नाक बहना, धुंदला दिखना, मितली, लार आना, ऐंठन, श्वास लेने में कष्ट, आँखों की पुतलियोंका संकुचन हो सकता है।

प्राथमिक चिकित्सा:

१. अगर निगल लिया: यदि व्यक्ति होश में और सतर्क है, तो पानी के साथ मुँह से कुल्ला करें और उसे १ या २ गिलास पानी पिलाए। बेहोश व्यक्ति को मुँह से कुछ भी न दे । डॉक्टर को बुलाए । जब तक चिकित्सक द्वारा कहा न जाए उल्टी न करवाए ।

२.अगर साँस ली जाए: मरीज को खुली हवा में लाए और शरीर के तापमान का ख्याल रखिए। मरीज साँस नहीं ले पा रहा है या साँस लेने में कठिनाई हो रही है तो उसे मुँह के द्वारा कृत्रिम श्वसन दे । चिकित्सक से परामर्श करें । **३. त्वचा संपर्क के मामले में:** अच्छी तरह से साबुन के साथ व्यवाद पानी से बाल और नाखूनों के नीचे सहित शरीर के प्रभावित हिस्से को भी धो ले । दर्द, लाली या जलन जारी रहती है तो डॉक्टर से परामर्श करें । सभी दूषित कपड़े अलग से और अच्छी तरह से उपयोग करने से पहले साबुन और पानी से धोए जाने चाहिए । **४. आँख से संपर्क के मामले में:** आँखे उचादा पानी से हल्के से कम से कम १५ मिनट तक धोए । अगर दर्द, जलन, लाली या फोटोफोबिया जारी रहता है तो नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श करें ।

विषनाशक कथन: कोई विशेष प्रतिविष ज्ञात नहीं । लक्षणों के अनुसार उपचार करें ।

सुरक्षा सावधानियां: १. छिड़काव करने वाले टोपी, लम्बी पतलून और जुते पहने । २. इस फफूंदीनाशक के प्रयोग के समय आँख व त्वचा से संपर्क से बचें । फफूंदीनाशक को सूंघे नही । उपयोग के समय मदिरापान या धूम्रपान मना है । इसके उपयोग पश्चात हाथों को साबून और पर्याप्त पानी से धोये । २. दूषित कपडों को अच्छी तरह धो ले । खाली डिब्बो को इस्तेमाल न करें । ४. काम के बाद और भोजन से पहले हाथों और चेहरा को साबून और पानी से अच्छी तरह धो लें ।

भंडारण के लिए निर्देश: १. कीटनाशक के पैकेजो को अलग कमरो या अलमारियों में अन्य पदार्थ, खास कर खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कमरों से दूर या अलग अलमारियों में कीटनाशक के प्रकार एवं परिमाण के अनुसार ताला बाबी में बंद करके रखा जाना चाहिए । २. संग्रह वाला कमरा अच्छी तरह बना हुआ, सुखा, रोशनीदार, ठंडा, हवादार तथा पर्याप्त आकार का लम्बा–चौड़ा होना चाहिए।

चेतावनी बयान: १. केवल लेबल और पर्चों में उल्लिखित फसलों एवं पीड़कों पर ही इसका उपयोग करे । २. पर्चों पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें । ३. यह उत्पाद मछली, जलीय जीवों और मधु मक्खियों के लिए बहुत जहरीला है, इसलिए जलीय कृषि में और उसके आसपास और मधुमक्खियों की सक्रिय भोजन की अवधि के दौरान इसके उपयोग से बचना चाहिए ।

प्रयुक्त कंटेनर्स, उपकरणों में बचा हुआ धोवन तथा बची हुई दवा का निपटान : १. निर्माता, संयोजनकारी एवं दवा का छिड़काव करनेवाली व्यक्ति का कर्तव्य है की वो खाली डिब्बे या बची दवा को सुरक्षित तरीके से नष्ट करें ताकि पर्यावरण और पानी प्रदूषण न हो । २. कीटनाशक के उपयोग के पश्चात खाली डिब्बों को पुन: उपयोग के लिए बाहर न छोड़े । ३.खाली डिब्बों को नष्ट कर, आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए ।

विपणनकर्ता: स्वॉल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

C/o. युपीएल लिमिटेड, रेडिमनी टैरेस, १६७, डॉ. अँनी बेसंट रोड,
वरली, मुंबई –४०० ०१८, महाराष्ट्र ।

कॉन्व्हे

कीटकनाशक

कारटाप हायड्रोक्लोराइड ७.५% + क्लोरान्ट्रानिलिप्रोल ०.४% जीआर

हे भातावरील पिवळे खोड पोखर, पान गुंडाळणारी अळी आणि देठाभोवतालची अळी यांच्या नियंत्रणासाठी वापरण्यात येते.

रासायनिक रचना:

घटक		प्रमाण (% व/व)
कारटाप हायड्रोक्लोराइड स.त.	:	७.५०
क्लोरान्ट्रानिलिप्रोल स.त.	:	०.४०
फॉस्फोरिक ॲसिड	:	०.३५
फॉस्फेट इस्टर ऑफ अल्कोहोल	:	०१.५०
अल्कोहोल एल्कोक्सीलेट	:	०२.५०
चायना क्ले	:	०४.३०
रिवर सँड	:	पर्याप्त मात्रा
कुल	:	**१००.००**

शिफारस:

पिकाचे नाव	लक्षित कीटकाचे सर्वसामान्य नाव	शेवटची फवारणी ते कापणी यातील अवधि (दिवसांमध्ये)	सक्रिय घटक (ग्रॅम)	मात्रासध (मिली)	पाण्यात मिश्रण (लि)
भात	पिवळा खोड पोखर, पान गुंडाळणारी अळी आणि देठाभोवतालची अळी	५९	६९१.२५	८७५०	लागू नाही

वापरासाठी सूचना: कारटाप हायड्रोक्लोराइड ७.५% + क्लोरान्ट्रानिलिप्रोल ०.४% जीआर यांची शिफारस करण्यात आलेली मात्रा ही ५० किग्रॅ/हेक्टर इतक्या वाळूमध्ये एकसमानपणे मिसळून विखुरणी करायला हवी.

हवामानाची स्थिती (सर्वसाधारणपणे): प्रतिकूल स्थितींदरम्यान वापर करू नये.

मृदा व पाणी (जेथे लागू असेल तेथे): हलकी ते जड मृदा.

वापर करण्यासाठी पिकाचा टप्पा: पुढील दिसून आल्यानंतरच्या दिवसांमध्ये– वानस्पतिक ते प्रजोत्पादन अवस्था दर्शवल्यानंतरचे दिवस.

वापराची तंत्रे: वाळूमध्ये मिश्रण केलेल्या ग्रॅन्युअल्सची विखुरणी.

उपकरणाचा प्रकार: हँड ऑपरेटेड ग्रॅन्युल्स ॲप्लिकेटर, मेकॅनिकल डिस्पेन्सरद्वारे किंवा हातात परिधान करायचे रबर ग्लोव्ज.

नोझलचा प्रकार: लागू नाही.

मात्रा: वरील शिफारशीचा संदर्भ घ्या.

मिश्रण करण्यासाठी सूचना: कारटाप हायड्रोक्लोराइड ७.५% + क्लोरान्ट्रानिलिप्रोल ०.४% जीआर यांची शिफारस करण्यात आलेली मात्रा ही ५० किग्रॅ/हेक्टर इतक्या वाळूमध्ये एकसमानपणे मिसळून विखुरणी करायला हवी.

पुनःप्रवेश कालावधी: २४ तास

कापणीपूर्व मध्यांतर (पीएचआय): वरील शिफारशीचा संदर्भ घ्या.

वापराचे स्वरूप व वेळ: विखुरणी, शक्यतो ते सकाळी किंवा संध्याकाळी करायला हवी.

वापराचे प्रकार: शेतातच्या कीटक दिसून येण्याच्या वेळी कारटाप हायड्रोक्लोराइड ७.५% + क्लोरान्ट्रानिलिप्रोल ०.४% जीआर वापरायचे आहे.

फवारणीच्या कमाल संख्येसह वारंवारता: एकेरी वापर.

ज्या टप्प्यांदरम्यान कोणत्याही पिकावर कीटकनाशकांचा वापर करू नये असे कोणतेही टप्पे: वरील शिफारशीचा संदर्भ घ्या.

मधमाश्या आणि कीटकांचे नैसर्गिक शत्रू यांसारख्या लाभदायी घटकांना अपाय पोहोचणे टाळण्यासाठी घ्यावयाची खबरदारी: हे उत्पादन मासे, जलीय जीव आणि मधमाश्या यांच्यासाठी अत्यंत विषकारक आहे, म्हणून जलचरांमध्ये आणि आसपास तसेच मधमाश्यांच्या सक्रियपणे खाद्य गोळा करण्याच्या कालावधीदरम्यान या उत्पादनाचा वापर टाळायला हवा.

विषबाधेची लक्षणे: सुस्ती, नाकातून स्राव येणे, धूसर दृष्टी, मळमळ, लाळ स्रवणे, मुरडा येणे, कष्टश्वास, बाहुली विस्फारणे अशी लक्षणे उद्‌भवू शकतात.

प्रथमोपचार: १. गिळले गेल्यास: जर व्यक्ती सावध आणि शुद्धीवर असेल तर, त्याचे तोंड पाण्याने धुवा आणि १–२ ग्लास पाणी प्यावयास द्या. बेशुद्ध व्यक्तीस कधीही तोंडावाटे काहीही देऊ नका. डॉक्टरांना बोलवा. उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी सांगितल्याशिवाय उलटी काढण्याचा प्रयत्न करू नका. **२. श्वासाद्वारे आत गेल्यास :** रुग्णाला मोकळ्या हवेत घेऊन जा आणि त्याच्या शरीराच्या तापमानावर लक्ष ठेवा. जर रुग्ण श्वासोच्छवास करीत नसल्यास किंवा रुग्णास बास घेताना त्रास होत असल्यास, शक्यतो तोंडाद्वारे कृत्रिम श्वसन द्या. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. **३. त्वचेशी संपर्क आल्यास:** संपर्कात आलेला शरीराचा भाग, केस आणि नखांखालील त्वचेसह, साबण व भरपूर पाणी वापरून धुवून घ्या. त्यानंतरही वेदना, लालसरपणा, किंवा जळजळ कायम राहिल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सर्व संसर्गित कपडे वेगळे ठेवा आणि पुन्हा वापरण्यापूर्वी साबण आणि पाण्याने व्यवस्थित धोवणे धुऊन घ्या. **४. डोळ्यांशी संपर्क आल्यास:** किमान १५ मिनिटे भरपूर पाण्याने हळुवारपणे धुवून घ्या. तरीही वेदना, जळजळ, लालसरपणा किंवा प्रकाश सहन न होणे अशी लक्षणे कायम राहिल्यास नेत्रतज्ज्ञाचा सल्ला घ्या.

उतारा कथन: कोणताही विशिष्ट उतारा नाही. लक्षणानुसार उपचार करा.

सुरक्षिततापविषयक खबरदारी: १. फवारणीकर्त्याने हॅट, लांब बाह्यांचा शर्ट, लांब पँट, आणि बूट असे योग्य संरक्षक कपडे घालावेत. २.फवारणी द्रावणाच्या अर्क हाताळताना डोळ्यांशी व त्वचेशी संपर्क येऊ देऊ नका. फवारणीचा धूर श्वासातून आत घेणे टाळा. हाताळल्यानंतर साबण व पाण्याने व्यवस्थित्पणे धुवून घ्या. फवारणी करत असताना काहीही खाऊ–पिऊ नका किंवा धूम्रपान करू नका. ३. संसर्गित कपडे काढून टाका आणि पुन्हा वापरण्यापूर्वी धुवून घ्या. रिकाम्या कंटेनर्सचा पुन्हा वापरू नका. ४. खाण्यापूर्वी तसेच काम झाल्यानंतर हात व संपर्कात आलेला त्वचेचा भाग साबण व पाण्याने धुवून घ्या.

साठवणीसाठी सूचना: १. कीटकनाशकांचा प्रकार आणि संख्या विचारात घेऊन, कीटकनाशक असलेली पैकेजेस इतर साठवणीच्या वस्तूंच्या विशेषकरून खाद्यपदार्थांच्या खोलीपासून किंवा जागेपासून दूर अशा वेगळ्या खोलीत अथवा जागी ठेवावेत किंवा वेगळ्या कपाटात कडीकुलुपात बंद ठेवावेत. २. कीटकनाशक ठेवलेली खोली किंवा जागा नीट बांधलेली, कोरडी, पुरेसा उजेड असलेली, हवेशीर आणि पुरेसा आकारनानाची असावी.

खबरदारीच्या सूचना: १. लेबल आणि माहितीपुस्तिकेत नमूद केलेल्या कारणांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणासाठी वापर करू नये. २. माहितीपुस्तिकेत निर्देशित केल्यानुसार वापरानंतर कंटेनर्सची विल्हेवाट लावावी. ३. हे उत्पादन मासे, जलीय जीव आणि मधमाश्या यांच्यासाठी अत्यंत विषकारक आहे, म्हणून जलचरांमध्ये आणि आसपास तसेच मधमाश्यांच्या सक्रियपणे खाद्य गोळा करण्याच्या कालावधीदरम्यान या उत्पादनाचा वापर टाळायला हवा.

वापरलेले डबे, उपकरणामधील वॉशिंग आणि अधिकची सामग्री यांची विल्हेवाट: १. कीणत्याही प्रकारे पर्यावरणहानी व जलप्रदूषण होऊ न देता सुरक्षित पद्धतीने पॅकेजेस किंवा जास्तीची सामग्री आणि धुणे यांची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी जीवनदायी कीटकनाशक उत्पादक, फॉर्म्यूलेटर्स आणि वापरकर्ते यांची असेल. २. वापरलेल्या पॅकेजेसचा पुनर्वापर टाळण्यासाठी ती उघडावायर ठेवू नयेत. ३. पॅकेजेस वस्तीपासून दूर नेऊन तोडावीत व पुरावीत.

विक्रेता: स्वॉल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

C/o. युपीएल लिमिटेड, रेडीमनी टेरेस, १६७, डॉ. ॲनी बेसन्ट रोड,
वरली, मुंबई –४०० ०१८, महाराष्ट्र.

ᱠᱚᱱᱵᱮ

ᱛᱷᱚᱞᱚᱢᱚᱞᱤᱭᱚᱱ

ᱠᱟᱨᱴᱟᱯ ᱦᱟᱭᱰᱨᱚᱠᱞᱚᱨᱟᱭᱰᱤᱞ ᱭᱚᱞᱚᱢᱚᱞᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱛᱟᱞᱤᱭᱚᱞᱤᱛᱷᱤᱞᱤᱭᱚᱞ ᱫᱚᱞᱚᱢᱚᱞᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱛᱟᱞᱤᱭᱚᱞᱤᱛᱷᱤᱞᱤᱭᱚᱞ ᱫᱚᱞᱚᱢᱚᱞᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱛᱟᱞᱤᱭᱚᱞᱤᱛᱷᱤᱞᱤᱭᱚᱞ ᱫᱚᱞᱚᱢᱚᱞᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱛᱟᱞᱤᱭᱚᱞᱤᱛᱷᱤᱞᱤᱭᱚᱞ

ᱫᱚᱱᱵᱮ ᱨᱮᱛᱟᱞᱤᱭᱚᱞᱤᱛᱷᱤᱞᱤᱭᱚᱞ ᱫᱚᱞᱚᱢᱚᱞᱤᱭᱚᱱ

Size: 285 X 210mm

ಕಾನ್ವೆ
ಕೀಟನಾಶಕ

ಕಾರ್ಟಾಪ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ೨.೫% + ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ ೦.೪% ಜಿಆರ್

ಎಕರಿಗೆ ಮೂರ ಪಡಕಲದ ಇಳವಿಶಿ ಹಾಕಿ ಇಳಿಸಿ, ಪತ್ತಿ ಇಳಿಯ ಇ ಇತ್ತಿಲ ಇಟ್ಟಿಗಾ ಪಾಲ ಇಸಿಸಿಕಾ ಪಾರ್ಗಿ ಇಳಿಯಲಾಗುವುದು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ :

ಇಳಿಯಲಾಗಿದ್ದ		ನಿಶಿಕ ಇಳಿಯ
ಕಾಲ್ಟಾಪ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಿ.ಪಿ.	:	೨.೫೦
ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರನಿಲಿಪ್ರೋಲ್	:	೦.೪೦
ಇಳಿಯಲಿಸಿದ ಎನೆಯ	:	೦೦.೧೬
ಇಳಿಯ ಇಳಿಯ ಪಿಎಚ್ ಆ್ಯಸಿಡಾಲಾಲ್	:	೦೧.೩೦
ಡಾಲಾಲಾಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್	:	೦೨.೩೦
ಡಾಲಾಲ ಇಳ	:	೦೪.೧೦
ಇಳ ಇಳಿ	:	ಪರಾಗದ ಇಳಿ ಗಾಲ
ಗೋಟ	:	೩೦೦.೦೦

ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ :

| ಇಳಿಯ ಹೆಸರು | ಇಳಿಯ ಇಳಿಯಾಲಿಗಳ ಇಳಿಯ ಇಳಿಯ | ಇಳಿಯ ಇಳಿಯ ಇಳಿಯ