Size : 285 x 210 mm

RiceBac

SYSTEMIC HERBICIDE

BISPYRIBAC SODIUM 10% W/V SC

Bispyribac sodium 10% W/V SC is a post emergence herbicides effective against grasses, sedges and broad leaf weeds of rice crop.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of weed	Dosage/HA AI (gm)	Formulation (ml)	Dilution in Water (Ltr.)	Waiting Period between last spray to harvest (days)
Rice (Nursery)	Echinochloa crusgalli, Echinochloa colonum, Ischaemum rugosum, Cyperus difformis, Cyperus iria Fimbrislylis miliacea, Eclipta alba, Ludwigia parviflora, Monochoria vaginalis, Alternathera Philoxeroides, Sphenoclea zoylanica	20	200	300	waiting period been redundant as period between spray and harvest has been >78 days
Rice (Transplanted)		20-25	200-250	300	
Rice (Direct seeded)		20-25	200-250	300	

Direction for use : Shake the bottle before use. Measure out requisite quantity of the herbicide and mix it well with small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation.

Application Method : prior to herbicides application the field should be drained. Field should be re-flooded within one day after application and water should be maintained at least for 10 days post application.

Spraying Instruction : Spray uniformly in the direction of wind. Ensure thorough coverage of the weeds.

Time of Application:

Nursery/Transplanted Rice : The optimum time of application is 10-12 days after sowing for nursery and 10-14 days after planting for transplanted rice when most of the weeds have already emerged and are of 3-4 leaf stage depending upon soil and climatic factors.

Direct Seed Rice : For direct seed rice the time of application is 15-25 days after sowing.

Plant Protection Equipment : High Volume sprayer viz., Knapsack sprayer fitted with flat fan/flood jet nozzle is recommended.

Precautions: 1. Keep away from food and feedstuff. 2. Avoid contact with eyes and skin. 3. Avoid inhalation of the spray mist. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.

Symptoms of Poisoning: Weakness, vomiting salivation and diarrhea.

First Aid: 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.If not breathing, clear the airway and give artificial respiration. Get a medical attention immediately.

Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of used container :

1. The package shall be broken and buried away from inhabitation.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their reused.
3. The package or surplus material and washing should be disposed off in safe manner so as to prevent environmental or drinking water pollution.

Storage Conditions :

1. The package containing the herbicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the herbicide.
2. The rooms or premises meant for storing the herbicides should be well built, dry well-lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination by vapour.

Chemical Composition:

Bispyribac Sodium a.i.:	10.00% w/v
Adjuvant-A (Polyalkylene oxide derivative of a synthetic alcohol):	31.90% w/v
Adjuvant-B (Polyoxyethylene polyoxy propylene synthetic alcohol ether):	53.20% w/v
Propylene glycol:	2.00% w/v
Aluminium Oxide C:	1.50% w/v
SiliconKS-506:	1.00% w/v
Stabilizer:	1.00% w/v
Water:	Q.S. % w/v
Total:	**100.00%w/v**

Caution: Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

Marketed by : SWAL CORPORATION LTD.,
Regd. Office: UPL LTD., Readymoney Terrace,
167, Dr. A. B. Road, Worli, Mumbai - 400 018, Maharashtra.

राईस बॅक

अंतर्प्रवाही खरपतवारनाशक

बिस्पाइरीबॅक सोडियम १० प्रतिशत भा./व. एस.सी.

बिस्पाइरीबॅक सोडियम १० प्रतिशत भा./व. एस.सी. धान फसल में उगने वाले विभिन्न प्रकार की घास, सेज़ेज व चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार का नियंत्रण करता है। इसका प्रयोग खरपतवार उगने के बाद किया जाता है।

उपयोग:

फसल	खरपतवार के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्राम)	संरचना (मिली)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
धान (नर्सरी)	सांवा, जंगली धान, ईंशचोमम, रुगोसम, मारगुला, छतरी वाला मौथा, फिबीस्टाइलिस, भांगरा, महानली, मोनोकोरिया, अल्टरनैन्थेरा, स्नाथ	२०	२००	३००	प्रतीक्षा अवधि आवश्यक नहीं है क्योंकि छिड़काव एवं कटाई के बीच की अवधि अधिक >७८ दिन है।
धान (रोपित)		२०–२५	२००–२५०	३००	
धान (सीधी बिजाई)		२०–२५	२००–२५०	३००	

उपयोग के लिए निर्देश : इस्तेमाल से पहले बोतल को अच्छी तरह हिलायें। उत्पाद की वांछित मात्रा को थोड़े से पानी के साथ घोल तैयार कर लें। इसके बाद यह घोल शेष पानी में डालकर मिलायें।

उपयोग विधि : खरपतवारनाशक के उपयोग से पहले वांछित क्षेत्र से पानी निकाल दें। उपचार के एक दिन बाद खेत को पुन: पानी से भर दें या १० दिन तक पानी को उपचारित क्षेत्र में बनाये रखें।

छिड़काव का समय : पौधशाला / रोपित धान के लिए : उचित समय है अधिकतर खरपतवार उगने के पश्चात अर्थात नर्सरी धान के लिए १०–१२ दिन बुआई के पश्चात एवं रोपित धान के लिए १०–१४ दिन रोपाई के पश्चात अवस्था में उपयोग करें। यह समय मिट्टी एवं वातावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप भिन्न हो सकती है।

सीधी बीजाई धान के लिए : छिड़काव का उचित समय बुआई के १५–२५ दिन पश्चात है।

छिड़काव यंत्र : हाई वॉल्यूम स्प्रेयर जिस पर फ्लेट फॅन या फ्लड जेट नोजल लगे हुए यंत्र का प्रयोग करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ:

१. खाद्य सामग्री और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. त्वचा और आंखों को सम्पर्क से बचायें। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपडों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के दौरान धुम्रपान, खाना व तम्बाकू इत्यादि का सेवन न करें।

विष के लक्षण: कमजोरी, उल्टी, मुँह से लार आना व अतिसार।

प्राथमिक चिकित्सा: १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें। यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़ों को उतार दें दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आँखें दूषित हो जायें तो लगभग १०वी १५ मिनिट सुधी पुष्कळ पाणीनी छालल मारी धुओ. ४. जो श्वासमां जाय तो दरदीने ताजा–ताजा हवामां लई जाओ. जो श्वास न लेवाय तो, श्वसनमार्ग स्पस्ट करो अने कृत्रिम श्वासोश्वास आपो. तरत तबीबी दोभणाद मेळवो।

विषनिवारण: कोई विशिष्ट विषनिवारक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों निपटारा :

१) खाली डिब्बों को उपयोग के बाद तोड़ कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें।
२) उपयोग के बाद खाली डिब्बों को दुबारा उपयोग में न आए अत: बाहर खुला ना छोड़ें।
३) बची हुई खरपतवारनाशक साधनों के धोवन का योग्य रीति से निपटारा करना चाहिए जिससे पीने का पानी तथा वातावरण दूषित होने का डर न रहे।

संग्रहण की शर्तें

१) खरपतवारनाशक के डिब्बों को अलग कमरे अथवा खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कमरे अथवा जगह से अलग अलमारियों में ताला चाबी के अन्दर रखना चाहिए।
२) जिस कमरे अथवा जगह में खरपतवारनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा हवादार तथा प्रकाश युक्त व काफी लम्बा चौड़ा होना चाहिए जिससे खरपतवारनाशक की भाप से वातावरण दूषित नहीं हो।

रासायनिक संरचना:

बिस्पाइरीबॅक सोडियम (स.त.):	१०.००% भा./व.
एडजुवेंट–ए (पोलिअल्कलीन आक्साईड सिंथेटिक एल्कोहल का डेरिवेटिव):	३१.९०% भा./व.
एडजुवेंट–बी (पोलीआक्सीथिलिन पोलिआक्सिप्रोप्लिन सिंथेटिक एल्कोहल ईथर):	५३.२०% भा./व.
प्रोपायलिन ग्लायकोल :	२.००% भा./व.
एल्युमिनियम ऑक्साईड सी:	१.५०% भा./व.
सिलिकॉन केएस–५०६:	१.००% भा./व.
स्टेबिलाइजर:	१.००% भा./व.
पानी:	पर्याप्त मात्रा % भा./व.
योग:	**१००.००% भा./व.**

सावधानी: इस लेबल / लीफलेट में दी गई फसलों के अलावा किसी भी अन्य फसल पर इसका उपयोग न करें।

विक्रेता : स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय : युपीएल लिमिटेड, रॉडमनी टेरेस,
१६७, डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई–४०० ०१८, महाराष्ट्र.

राईसभेक

आंतरप्रवाही निंदानाशक

बायस्पायरिबेंक सोडियम १०% डब्ल्यु/वी (प/भ्र) अेससी

बायस्पायरिबेंक सोडियम १०% डब्ल्यु/वी (प/भ्र) अेससी अंकुरण पछी उपयोग करवानुं निंदानाशक छे जे ओळखा पांडमां घास, अरोडिंदर पांदवाळा छोड अने पहोळा पानना निंदामण पर असरकारक छे.

भलामण:

पाक(पाडो)	निंदामणनुं सामान्यनाम	मात्रा/हेक्टर स.त. (ग्राम)	संरचना (मिली)	पाणीमां मिश्रण (लीटर)	छेल्ला छंटकाथी लणणी सुधीनुं अंतराल (दिवसो)
धान (नर्सरी)	ओयोना (नर्सरी) ओयिनोयोला क्रूसगल्ली, ओयिनोयोला कोलोनम, एथायेमइशोरम, सायपरस डिझोमिस, सायपरस ड्रीसा फिम्बिस्टील्लिस मिलिअेसीआ, अेक्लिप्टा आल्बा, लुडविजिआ पार्विफ्लोरा, मोनोकोरीआ वेजिनालिस, अल्टरनान्थेरा फिलोक्सेरोइडस, स्फेनोक्लेआ झोलान्निया	२०	२००	३००	छंटकाथी लणणी पख्वेनी अवधि >४८ दिवसो रहीने अे मुश्कळ थेवानी अवधिनी वधारे नथी.
	ओयोना (डेरपेपली)	२०– २५	२००– २५०	३००	
	ओयोना (ओयनी सीधी वावणी)	२०– २५	२००– २५०	३००	

उपयोग माटेनो निर्देश: उपयोग करता पहेलां बाटलीने हलावो. निंदामणाशक नी जरूरी मात्रा मापो अने पाणीनी थोडी मात्रानी साथे अेनुं सरसुं मिश्रण करो. बधाएया मुश्कळ बाकी पछेली पाणीनी मात्रा जोडेही हलावीने ऊमेरो.

ऊपयोग करवानी रीत: निंदामणानाशक नो ऊपयोग करता पहेलां खेतरने भीजवुं जोईअे. ऊपयोग पछी १ दिवसनी अंदर खेतरमां पाणीनो रेडवाय करवो जोईअे अने ऊपयोग पछी १० दिवस सुधी खेतरमां पाणी जाणवी राखवुं जोईअे.

छंटकायनी सूचनाओ: हवानी दिशामां अेकसमान रीते छांटो. निंदामणा बरोबर आवरी लेवानी भाळरीराखो.

ऊपयोग माटेनो समय

नर्सरी/ड्रेरोपपली करेला ओयोना: ऊपयोग माटेनो पर्याप्त समय छे नर्सरी माटे वावणी पछी १०–१२ दिवसो अने ड्रेरोपपली करेला ओयोना माटे ड्रेरोपपली पछी १०–१४ दिवसो ज्यारे मोटाभागनुं निंदामण घीगी नीकळ्युं होय अने ३–४ पानना तबक्कामां होय छे माटी अने हवामाननां परिबळो पर आधार राखे छे.

बीजनी सीधी वावणी करेला ओयोना: बीजनी सीधी वावणी करेला ओयोना माटे ऊपयोग माटेनो समय छे वावणी पछी १५–२५ दिवसो.

पाक संरक्षणनां साधनो: ड्रोप्टेड ऐन/ड्रप्स फेट नोझल फिट करेला नेपसेक स्प्रेयर फेवा हाई वोल्युम स्प्रेयरनी भलामण कराय छे.

सावचेतीओ: १. खाद्यपदार्थ अने पशुचारानी दूर राखो. २. आंख अने त्वचा साथेनो संपर्क टाळो. ३. छंटकायनी ठाडण (स्प्रांट) श्वासमां न श्वचा टो. ४. छंटकाय पछी दूषित ऽपडां अने शरीरनां अंगो ब्रळाब धुओ. छंटकाय करता समये धुम्रपान, पीवुं, खावुं अने ईंडपिणो चगणवुं नहीं.

ऊेर यद्यनांनां लक्षणो: नबळाई, ऊिलटी, लाળ अने अतिसार.

प्राथमिक ऊपचार: १. जो गळी ज्वाय तो गळानां पाछळना भागमां आंगळी नांखी ऊिलटी कराववानो प्रयत्न करो. जो हटटी बेभान होय तो ऊिलटी कराववानो प्रयत्न न करो. २. जो कपडां अने त्वचा दूषित होय तो, ऽपडां हाढी नांखो अने पुष्कळ साबु अने पाणीथी दूषित त्वचाने धुओ. ३. जो आंख दूषित होय तो लगभग १०वी १५ मिनिट सुधी पुष्कळ पाणीनी छालल मारी धुओ. ४. जो श्वासमां जाय तो दरदीने शुद्ध–ताजी हवामां लई जाओ. जो श्वास न लेवाय तो, श्वसनमार्ग स्पस्टश करो अने कृत्रिम श्वासोश्वास आपो. तरत तबीबी दोभणाद मेळवो.

विषनिवारण: कोई विशिष्ट विषनिवारक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों निपटारा :

१) खाली डिब्बों को उपयोग के बाद तोड़ कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें।
२) उपयोग के बाद खाली डिब्बों को दुबारा उपयोग में न आए अत: बाहर खुला ना छोड़ें।
३) बची हुई खरपतवारनाशक साधनों के धोवन का योग्य रीति से निपटारा करना चाहिए जिससे पीने का पानी तथा वातावरण दूषित होने का डर न रहे।

संग्रहण की शर्तें

१. निंदामणानाशक धरावता पेंडेण्डनो संग्रह अन्य पदार्थ, खास करीने खाद्यपदार्थ माटे वपरातां ओरडा अथवा स्थानथी अलग ओरडामां ऽरवो जोईअे अथवा निंदामणानाशनी मात्रा अने प्रकार प्रमाणे अलग कबाटमां तालायाचीमां ऽरवो जोईअे.
२. निंदामणानाशना संग्रह माटेना ओरडा अथवा स्थान सारा बांधेला, सूका, हवाऊशसयाळा, हवानी अवरजवरवाळा अने प्रयीत लांबा अने पहोळा होवा जोईअे अेथी बाष्पथी दूषित न थाय.

रासायधिक संरचनानं:

बायस्पायरिबेंक सोडियम स.ध.:	१०.००% डब्ल्यु/वी
सह्योगी पदार्थ–अे (पोलीअल्काइलीन ऑक्साईड ड्रेमिक आल्कोहोलनु डिराइविटिव):	३१.९०% डब्ल्यु/वी
सह्योगी पदार्थ–बी (पोलीओक्सिइथाइलीन पोलीओक्सिप्रोपीलीन ड्रेमिक आल्कोहोल ईथर):	५३.२०% डब्ल्यु/वी
प्रोपीलीन ग्लायकोल :	२.००% डब्ल्यु/वी
अेल्युमिनियम ऑक्साईड सी :	१.५०% डब्ल्यु/वी
सिलिकोन के एस–५०६ :	१.००% डब्ल्यु/वी
स्टाबिलायझर :	१.००% डब्ल्यु/वी
पाणी :	क्यु. एस. % डब्ल्यु/वी
कुंल:	**१००.००% डब्ल्यु/वी**

सावचेतीः आ लेबल/पत्रिपत्रमां जणाव्या सिवायना अन्य पाकोने पर ऊपयोग न ऽरवो जोईअे.

विक्रेता : स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
नोंदणीकृत कार्यालय : युपीएल लिमिटेड, रॉडमनी टेरेस,
१६७, डॉ. अेनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई–४०० ०१८, महाराष्ट्र.

राईस बॅक

प्रणालीगत तणनाशक

बायस्पायरीबॅक सोडीयम १०% डब्ल्यु/व्ही एससी

बायस्पायरी बॅक सोडीयम १०% डब्ल्यु/व्ही एससी हे धान फसलमधील फवारावयाचे तणनाशक असून भातशेतीतील तण, गवत व रूंद पानाच्या तणप्रजाती परिणामकारक आहे.

शिफारस :

पिक (के)	तणाचे सामान्य नाव	डोसचे प्रमाण / हेक्टर य. आय (ग्रॅम)	पदार्थ (मिली)	पाण्यात द्रावण (ली)	शेवटची फवारणी ते हंगामापर्यंत वाट पाहण्याचा कालावधी (दिवस)
भातशेती (रोपवाटिका)	एकिनोक्लोवा क्रुसगाली एकिनोक्लोवा कोलोनम इशायेम इशोरम, सायपरस डिझोमिस, सायपरस ड्रीसा फिम्बिस्टील्लिस मिलिअेसीआ, अेक्लिप्टा आल्बा, लुडविजिआ पार्विफ्लोरा, मोनोकोरीया वेजीनालिस, अल्टरनान्थेरा फिलोक्सेरोईड्स, स्फेनोक्लिया झोलान्निया	२०	२००	३००	फवारणी ते कापणी दरम्यानचा कालावधी ७८ दिवसांपेक्षा कमी असल्याने वाट पाहण्याचा कालावधी महत्वाचा नाही
भातशेती (पुर्नलागवड)		२०–२५	२००–२५०	३००	
भातशेती (थेट पेरणी)		२०–२५	२००–२५०	३००	

वापरण्यासाठी सूचना : हा पदार्थ वापरण्यापूर्वी बाटली चांगली ढवळा. आवश्यक तितके तणनाशक घेऊन थोड्यासा पाण्यात चांगले ढवळा. आता त्यामध्ये उरलेले पाणी घालून ते चांगले ढवळा.

वापरण्याची पध्दत : हे तणनाशक फवारण्यापूर्वी शेतातील पाण्याचा निचरा झाला पाहिजे. फवारणीनंतर एक दिवसात शेतात पुन्हा मर्यादित पाणी सोडावे आणि किमान १० दिवस ते पाणी साचून ठेवावे.

वापरण्यासाठी सूचना : वाऱ्याच्या दिशेने सम प्रमाणात फवारणी करा. संपूर्ण तणावर फवारणी केल्याची खात्री करा.

वापरण्याची वेळ :

रोपवाटिका / पुर्नलागवडीची भातशेती : फवारणीची इष्टतम वेळ ही रोपवाटिकेसाठी १०–१२ दिवस आणि पुर्नलागवडीच्या भातशेतीसाठी जमीनीचा प्रकार व हवामानाची स्थिती ह्यानुसार तण ३–४ पानाचे झाल्यावर १०–१४ दिवसांनी फवारणी करावी.

थेट पेरणीच्या भातशेतीसाठी : थेट पेरणीच्या भातशेतीसाठी पेरणीनंतर १५–२५ दिवसांनी फवारणी करावी.

रोपण्या संरक्षणासाठी साधनी : अधिक आवाजाचे फवारणी पंप उदा. फ्लॅट फॅन/ फ्लड जेट नॉझल बसवलेल्या पाठीवर बांधायच्याच्या फवारणी पंपाची शिफारस करण्यात येते.

खबरदारी : १. खाद्यपदार्थ व गुरा–ढोरांच्या खाद्यापासून दूर ठेवा. २. अंगावर व डोळ्यात उडणार नाही ह्याची काळजी घ्यावी. ३. फवारणीचे द्रावण श्वासावाटे आत जाणार नाही ह्याची काळजी घ्या. ४. फवारणीनंतर साबणाच्या आंघोळ करा व दूषित कपडे धुवा. ५. फवारताना खाणे–पिणे व धुम्रपान करण्यात टाळा.

विषबाधा झाल्याची लक्षणे : अशक्तपणा, उलटी येणे, लाळ पडणे व अतिसार.

प्रथमोपचार : १) पोटात गेल्यास, ओकारी काढण्यास प्रवृत्त करा. रूग्ण शुध्दीवर नसल्यास ओकारी काढण्यास प्रवृत्त करू नका. २) अंगावर पडून कपडे खराब झाल्यास ते बदला व भरपूर पाण्याने व साबणाने आंघोळ करा. ३) डोळ्यात उडाल्यास सुमारे १० ते १५ मिनिटे पाण्याचे हबकारे मारा. ४) श्वासावाटे पोटात गेल्यास रूग्णाला मोकळ्या हवेत न्या. ती व्यक्ति श्वासोच्छवास करत नसल्यास श्वसनमार्ग मोकळा करुन कृत्रिम श्वासोच्छवास द्या. लागलीच डॉक्टरांकडे न्या.

प्रतीविष : दवाविक प्रतीविष ताऊक नाही. लक्षणानुसार उपचार करा.

रिकामी डब्यांची विल्हेवाट :

१. वापरलेले पाकिट फोडून गावनी वस्तीपासून लांब जमिनीत गाडावीत.
२. पुर्नवापर टाळण्यासाठी रिकामी पाकिटे उपद्रवावर फेकू नका.
३. वापरलेले पाकिटे किंवा अतिरिक्त पदार्थ व मशीनमधील वॉशिंग ह्यांची सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावायी जेणेकरून पर्यावरण किंवा पिण्याचे पाणी दूषित होणार नाही.

साठवणूक :

१. हे तणनाशक असलेले पाकिट एका वेगळ्या खोलीत किंवा ठिकाणी, अन्य पदार्थ खास करून खाद्यपदार्थ ठेवण्यासाठी असलेल्या खोली किंवा ठिकाणापासून वेगळ्या ठिकाणी किंवा खोलीत किंवा तणनाशकाच्या प्रमाण व स्वरूपानुसार एका वेगळ्या कुलुपबंद कपाटात ठेवावे.
२. हे तणनाशक ठेवण्यासाठी असलेली खोली पक्क्या बांधकामाची, कोरडी, भरपूर उजेड असलेली, ऐसपैस व हवेशीर असावी, जेणेकरुन हवेशी बाष्पीभवनाद्वारे संपर्काने येणार नाही

रासायनिक रचना :

बायस्पायरीबॅक सोडीयम ए. आय.	१०.००% डब्ल्यु/व्ही
अॅडजुवान्ट–ए (पॉलिअल्कलिन ऑक्साईड ड्रेरीवॅटीव्ह सिन्थेटीक अल्कोहोल)	३१.९०% डब्ल्यु/व्ही
अॅडजुवान्ट–बी (पॉलिऑक्सिइथिलीन पॉलिऑक्सिप्रोपीलीन सिन्थेटीक अल्कोहोल एथर) :	३.२०% डब्ल्यु/व्ही
प्रोपीलीन ग्लिकोल	२.००% डब्ल्यु/व्ही
अॅल्युमिनियम ऑक्साईड सी :	१.५०% डब्ल्यु/व्ही
सिलिकोन के एस–५०६ :	१.००% डब्ल्यु/व्ही
स्टाबिलायझर :	१.००% डब्ल्यु/व्ही
पाणी :	क्यु. एस. % डब्ल्यु/व्ही
एकूण	**१००.००% डब्ल्यु/व्ही**

ताकिद : लेबल व माहितीपत्रिकेवर नमूद केलेल्या पिकाव्यतिरिक्त अन्य पिकासाठी वापरू नये.

विपणन द्वारा : **स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,**
नोंदणीकृत कार्यालय: युपीएल लिमिटेड, रेडीमनी टेरेस,
१६७, डॉ. अेनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई–४०० ०१८, महाराष्ट्र.

ગ્રાઇસબ્રોક

પૂરક્રાલીઝડ નલીનનાશક

બિસપાઇરિબિક સોડિઅમ 10% ડબલિયુ/વી એસસી

બિસપાઇરિબિક સોડિઅમ 10% ડબલિયુ/વી એસસી ઉજ્વરડ કે તથા ઉગવલ્યાનંતર વફારાવાયેલ તણનાશક અસુન ભાતશેતીતીલ તણ, ગવત વ રુંદ પાનાઇયા તણપ્રજાતી પરિણામકારક આહે.

શિફારસ :

પિક (કે)	તણાચે સામાન્યનાવ	ડોસચે પ્રમાણ / હેક્ટર य. आय (ग्रॅम)	પદાર્થ (મિલી)	પાણ્યાત દ્રાવણ (લિ)	શેવટચી ફવારણી તે હંગામાપર્યંત વાટ પાહણ્યાચા કાલાવધી (દિવસ)
ભાતશેતી (રોપવાટિકા)	એકિનોક્લોવા ક્રુસગાલી એકિનોક્લોવા કોલોનમ, ઇશાઇમ રોગોસુમ સાયપેરસ ડિફોર્મિસ, સાયપરસ ઇરિઆ ફિમ્બિસ્ટીલિસ મિલિએસીઆ, એક્લિપ્ટા આલ્બા, લુડવિજિઆ પાર્વિફ્લોરા, મોનોકોરીઆ વેજિનાલિસ, અલ્ટરનાન્થેરા ફિલોક્સેરોઇડસ, સ્ફેનોક્લેઆ ઝોલાન્નિયા	૨૦	૨૦૦	૩૦૦	ફવારણી તે કાપણી દરમ્યાનચી કાલાવધી ૭૮ દિવસાંપેક્ષા કમી અસલ્યાને વાટ પાહણ્યાચા કાલાવધી મહત્વાચા નાહી
ભાતશેતી (પુર્નલાગવડ)		૨૦–૨૫	૨૦૦–૨૫૦	૩૦૦	
ભાતશેતી (થેટ પેરણી)		૨૦–૨૫	૨૦૦–૨૫૦	૩૦૦	

વાપરણ્યાસાઠી સૂચના : હા પદાર્થ વાપરણ્યાપૂર્વી બાટલી ચાંગલી ઢવળા. આવશ્યક તિતકે તણનાશક ઘેઉન થોડ્યાસા પાણ્યાત ચાંગલે ઢવળા. આતા ત્યામધ્યે उरलेल पाणी घालून ते चांगले ढवळा.

વાપરણ્યાની પધ્ધત : हे तणनाशक फवारण्यापूर्वी शेतातील पाण्याचा निचरा झाला पाहिजे. फवारणीनंतर एक दिवसात शेतात पुन्हा मर्यादूत पाणी सोडावे आणि किमान १० दिवस ते पाणी साचून ठेवावे.

વાપરણ્યાસાઠી સૂચના : વાયાચ્યા દિશેને સમ પ્રમાણાત ફવારણી કરા. સંપૂર્ણ તણાવર ફવારણી કેલ્યાચી ખાત્રી કરા.

વાપરણ્યાચી વેળ :

રોપવાટિકા / પુર્નલાગવડીચી ભાતશેતી : ફવારણીચી ઇષ્ટતમ વેળ ही रोपवाटिकेसाठी १०–१२ दिवस आणि पुर्नलागवडीच्या भातशेतीसाठी जमीनीचा प्रकार व हवामानाची स्थिती ह्यानुसार तण ३–४ पानाचे झाल्यावर १०–१४ दिवसांनी फवारणी करावी.

થેટ પેરણીચ્યા ભાતશેતીસાઠી : थेट पेरणीच्या भातशेतीसाठी पेरणीनंतर १५–२५ दिवसांनी फवारणी करावी.

રોપણ્યા સંરક્ષણાસાઠી સામુગી : अधिक आवाजाचे फवारणी पंप उदा. फ्लॅट फॅन/ फ्लड जेट नॉझल बसवलेल्या पाठीवर बांधायच्याच्या फवारणी पंपाची शिफारस करण्यात येते.

ખબરદારી : १. खाद्यपदार्थ व गुरा–ढोरांच्या खाद्यापासून दूर ठेवा. २. अंगावर व डोळ्यात उडणार नाही ह्याची काळजी घ्यावी. ३. फवारणीचे द्रावण श्वासावाटे आत जाणार नाही ह्याची काळजी घ्या. ४. फवारणीनंतर साबणाच्या आंघोळ करा व दूषित कपडे धुवा. ५. फवारताना खाणे–पिणे व धुम्रपान करण्यात टाळा.

વિષબાધા ઝાલ્યાચી લક્ષણે : અશક્તપણા, ઉલટી યેણે, લાળ પડણે વ અતિસાર.

પ્રથમોપચાર : १) पोटात गेल्यास, ओकारी काढण्यास प्रवृत्त करा. रूग्ण शुध्दीवर नसल्यास ओकारी काढण्यास प्रवृत्त करू नका. २) अंगावर पडून कपडे खराब झाल्यास ते बदला व भरपूर पाण्याने व साबणाने आंघोळ करा. ३) डोळ्यात उडाल्यास सुमारे १० ते १५ मिनिटे पाण्याचे हबकारे मारा. ४) श्वासावाटे पोटात गेल्यास रूग्णाला मोकळ्या हवेत न्या. ती व्यक्ति श्वासोच्छवास करत नसल्यास श्वसनमार्ग मोकळा करुन कृत्रिम श्वासोच्छवास द्या. लागलीच डॉक्टरांकडे न्या.

પ્રતીવિષ : दवाविक प्रतीविष ताऊक नाही. लक्षणानुसार उपचार करा.

રિકામી ડબ્યાંચી વિલ્હેવાટ :

१. वापरलेले पाकिट फोडून गावनी वस्तीपासून लांब जमिनीत गाडावीत.
२. पुर्नवापर टाळण्यासाठी रिकामी पाकिटे उपद्रवावर फेकू नका.
३. वापरलेले पाकिटे किंवा अतिरिक्त पदार्थ व मशीनमधील वॉशिंग ह्यांची सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावायी जेणेकरून पर्यावरण किंवा पिण्याचे पाणी दूषित होणार नाही.

સાઠવણૂક :

१. हे तणनाशक असलेले पाकिट एका वेगळ्या खोलीत किंवा ठिकाणी, अन्य पदार्थ खास करून खाद्यपदार्थ ठेवण्यासाठी असलेल्या खोली किंवा ठिकाणापासून वेगळ्या ठिकाणी किंवा खोलीत किंवा तणनाशकाच्या प्रमाण व स्वरूपानुसार एका वेगळ्या कुलुपबंद कपाटात ठेवावे.
२. हे तणनाशक ठेवण्यासाठी असलेली खोली पक्क्या बांधकामाची, कोरडी, भरपूर उजेड असलेली, ऐसपैस व हवेशीर असावी, जेणेकरुन हवेशी बाष्पीभवनाद्वारे संपर्काने येणार नाही

રાસાયનિક રચના :

બાયસ્પાયરીબેંક સોડીયમ ए. आय.	૧૦.૦૦% ડબ્લ્યુ/વી
એડજુવાન્ટ–એ (પોલિઅલ્કલિન ઑક્સાઇડ ડેરીવેટીવ સિન્થેટીક અલ્કોહોલ)	૩૧.૯૦% ડબ્લ્યુ/વી
એડજુવાન્ટ–બી (પોલિઑક્સિઇથિલીન પોલિઑક્સિપ્રોપીલીન સિન્થેટીક અલ્કોહોલ એથર) :	૩.૨૦% ડબ્લ્યુ/વી
પ્રોપીલીન ગ્લિકોલ	૨.૦૦% ડબ્લ્યુ/વી
એલ્યુમિનિયમ ઑક્સાઇડ સી :	૧.૫૦% ડબ્લ્યુ/વી
સિલિકોન કે એસ–૫૦૬ :	૧.૦૦% ડબ્લ્યુ/વી
સ્ટેબિલાઇઝર :	૧.૦૦% ડબ્લ્યુ/વી
પાણી :	ક્યુ. એસ. % ડબ્લ્યુ/વી
કુલ:	**૧૦૦.૦૦% ડબ્લ્યુ/વી**

સાવધાન: આ લેબલ / પત્રિકામાં જણાવ્યા સિવાયના અન્ય પાકો પર ઉપયોગ ન કરવો જોઇએ.

વિક્રેતા : **સ્વાલ કૉર્પોરેશન લિમિટેડ,**
નોંધણીકૃત કાર્યાલય: યુપીએલ લિમિટેડ, રેડીમની ટેરેસ,
૧૬૭, ડૉ એની બેસંટ રોડ, વરલી, મુંબઈ–૪૦૦ ૦૧૮, મહારાષ્ટ્ર.

ਰਾਇਸਵਾਕ

ਪਦਕਿਤਗਤ ઉદ્ભિદ નાશક

બિસપાઇરિવાક સોડિયામ ૧૦% ડબ્લિ/ડિ એસસિ

બિસપાઇરિવાક સોડિયામ ૧૦% ડબ્લિ/ડિ એસસિ ઇસ્તેમાલ કરેલ પોસ્ટ ઇમાર્ગજંગ ઉદ્ભિદનાશક થા થાનેલ ફસલેલ ઘાસ, શેડલાં એવં ચડડા પાતાર આણાણા નિચ્ચરૂવેલ જન્ય કાર્યકર્મ ।

સુપારિશ :

ફસલ	આવાશ્યક સાવાવાન નામ	ઇતિ હેક્ટેર પ્રરાણમાવા એ.આઇ (ગ્રામ)	ફર્મૂલેશન (મિલિ)	જલમાં ઉકલીકરણ (લિ.)	અન્તિમ છેલ્લ કરતાં ફસલ કાતીવ મિન પર્યન્ત અન્તમવાન સમયકાલ
ડાલ (નાર્સારિ)	એચિનોક્લોઆ ક્રુસગાલિ, એચિનોક્લોઆ કલાનમ, ઇશાચિઆમ રાગોસામ, સાઇપરાસ ડિફર્મિસ, ઇરિઆ નાઇપરાસ ફિમ્બિસ્ટાલાઇસિસ મિલિઆસિઆ, એકલિપ્તી આલબા, મોનોચોરિઆ વાગિનાલિસ, અલ્ટરનાન્થેરા ફિલાક્સરોઇડસ, સ્ફેનોક્લોઇઝોલાનિકા	૨૦	૨૦૦	૩૦૦	અન્તમવાન સમયકાલ અનાશ્યક કારણ ત્યાં–૨ થેકે ફસલ કાટિ પછી ૭૮ દિનોર વેળાં ।
ડાલ (ટ્રાંસપ્લાન્ટેડ)		૨૦–૨૫	૨૦૦–૨૫૦	૩૦૦	
ડાલ (સરાસરિ રી

Size : 285 x 210 mm

RICEBAC®

Bispyribac Sodium 10% SC

Herbicide

MANUFACTURED BY : UPL LIMITED, REGD. OFFICE: 3-11, G.I.D.C., VAPI - 396 195, GUJARAT.

MARKETED BY: SWAL CORPORATION LTD., C/O. **UPL LTD.,** READYMONEY TERRACE, 167, DR. A. B. ROAD, WORLI, MUMBAI - 400 018, MAHARASHTRA.

निर्माता : यूपीएल लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : 3.11, जी.आई.डी.सी., वापी–396 195, गुजरात

विपणनकर्ता : स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, C/o. यूपीएल लिमिटेड, रेडिमनी टैरेस, 167, डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई–400 018, महाराष्ट्र

FOR SUGGESTIONS AND COMPLAINTS, CONTACT: MANAGER, (CUSTOMER CARE) - SWAL CORPORATION LTD., C/O. UPL LTD., READYMONEY TERRACE, 167, DR. A. B. ROAD, WORLI, MUMBAI - 400 018, MAHARASHTRA.
TEL NO.: 1800-233-2020,
EMAIL: CUSTOMER.CARE@SWAL.IN

SWAL

ৰাইস্ব্যাক

সাশৰীৰ অপকৃণনাশক

বাইস্পাইবিবেক ছ'ডিয়াম ১০% ডব্লিউ/ডি এচচি

বাইস্পাইবিবেক ছ'ডিয়াম ১০% ডব্লিউ/ডি এচচি হৈছে এবিধ গজালি ওলোৱাৰ পাছত প্ৰয়োগ কৰিব পৰা অপকৃণনাশক যিটো ধান খেতিত হোৱা ঘাঁহ, বন আৰু বহল পাতৰ অপকৃণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে ফলদায়ক।

অনুমোদন:

শস্য (সমূহ)	অপকৃণৰ সাধাৰণ নাম	মাত্ৰা / প্ৰতি হেক্টৰত এ.আই. (গ্ৰাম)	সূত্ৰৰূপ পানীত (লিটাৰ)	পোৱাবৰ বাবে ব্যৱহাৰৰ পৰা শস্য (দিনীয়া)
ধান (কটিয়া/জালী)	এচিন'ক্সোৱা ক্ৰুগালাস, এচিন'ক্সোৱা ফলাগাৰা, ইয়াম্প ঘাঁহ'ঘাম, চাইপেৰাচ ডিফাৰ্মিস, চাইপেৰাচ ইবিয়া বিফ্ৰেক্টাইলিচ মিলিংএচিয়া, ফিম্ব'ৰিচ ধৰ্মা, লাচনেথিৰেকা পাৰিজা'ৰা, ফাইবিয়া ডেলিচেলিয়া, অপ্টিকনাবেকা ডিলাৰিকয়েচ, স্পেনা'ৰিয়া অফলাসিকা	২০ ২০০ ৩০০	আৰু শস্য চপোৱাৰ বাবে অতিৰিক্ত প্ৰতীক্ষা মাত্ৰা >১৮ দিন
ধান (কটিয়া বোৱা)		২০-২৫ ২০০-২৫০ ৩০০		ছটিওৱাৰ বাবে নিৰ্দেশ
ধান (পোৰপীয়াকৈ ওচি দিয়া)		২০-২৫ ২০০-২৫০ ৩০০		
চহ	এইচ'ক্লুটা ক্ৰুগালাস, এইচ'ক্লুটা কৌলাটম, ইয়াম্প ঘাঁহ'ঘাম, চাইপেৰাচ ডিফাৰ্মিস, চাইপেৰাচ ইবিয়া, ফিম্ব্ৰিষ্টিলিস ফিম্ব্ৰিষ্টিলিস, ফিম্ব্ৰিষ্টিলিস ডিচোটোমা, অপ্টিকনাবেকা ডিলাৰিকয়েচ, স্পেনা'ৰিয়া অফলাসিকা	২০ ২০০ ৩০০	ছটিওৱাৰ বাবে নিৰ্দেশ
ধান (পোৰপীয়াকৈ ওচি দিয়া)		২০-২৫ ২০০-২৫০ ৩০০		

প্ৰয়োগৰ বাবে নিৰ্দেশ: বাহৰাৰৰ পূৰ্বে বটলটো জোকাবি লওক। অপকৃণৰ আৰ্দ্ৰতাশীল পৰিমাণ জুখি লওক আৰু সমান্য পৰিমাণৰ পানীত ভালদৰে মিলাওক। ভালদৰে ঘাটে মিহিল হয় তাৰ বাবে বাকী থকা পানীখিনি দিয়ক।

প্ৰয়োগৰ পদ্ধতি: প্ৰথমে পৰা অপকৃণনাশক প্ৰয়োগ কৰাৰ বাবে পথাৰখনৰ পৰা জলনিষ্কাশন কৰি লওক। প্ৰয়োগ কৰাৰ পাছত এদিনৰ ভিতৰত পথাৰখন পুনৰ জলসিঞ্চিত কৰা উচিত আৰু প্ৰয়োগৰ পাছত আৰু কমেও ১০ দিনত পানী পৰিচালিত কৰা উচিত।

ছটিওৱাৰ নিৰ্দেশ: বতাহৰ দিশত একে সমানভাৱে ছটিয়াব লাগে। অপকৃণ কডাৰ কৰাটো সুনিশ্চিত কৰিব লাগে।

প্ৰয়োগৰ সময়:

কটিয়া জলী/কটিয়া বোৱা: প্ৰয়োগৰ অনুকূল সময় হৈছে কটিয়াজলীত সিচিৰ্ত্বা ১০-১২ দিনৰ পিছত আৰু কটিয়া বোৱাৰ ১০-১৪ দিনৰ পিছত। যেতিয়া বেছিভাগ অপকৃণ ইতিমধ্যে গজে আৰু মাটি তথা জলবায়ু কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ০-৪ পাতৰ পৰ্যায়ত থাকে।

পোৰপীয়া ওচি ধান: পোৰপীয়া ওচি ধানৰ বাবে প্ৰয়োগৰ সময় হৈছে সিচিৰ্ত্বা ১৫-২৫ দিনৰ পাছত।

উচিম ফুবাৰ সঁজুলি: উচ্চ আয়তনৰ স্প্ৰেয়াৰ যেনে ফ্লেট ফেন / ফ্লাট জেট নজল লগোৱা নেপচেক স্প্ৰেয়াৰ অনুমোদন কৰা হয়।

সতৰ্কতাসমূহ: ১) ঘোৱা ৰস্ত আৰু পশুৰ নদাৰ পৰা দূৰত ৰাখিব। ২) চহু আৰু হাতত লাগিবলৈ দিবি। ৩) নিছাৰৰ কুৰ্ণিত কণা উপাদেয় ডিচবলৈ যাবলৈ দিবি। ৪) প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছত দৃষ্টিত হোৱা কাপোৰ আৰু শৰীৰৰ অংগবোৰ ভালদৰে ধুই পেলাব। ৫) প্ৰয়োগ কৰাৰ সময়ত ধূমপান নকৰিব, খোৱা বস্তু নাখাব আৰু নুচুবাব।

বিষক্রিয়াৰ লক্ষণসমূহ: দুৰ্বল লগা, বমি হোৱা, লেলাউচি ওলোৱা আৰু পেটৰ অসুখ আদি।

প্ৰাথমিক চিকিৎসা: ১) যদি পেটলৈ যায়, ডিজিলৈ আঙুলি ভৰাই বমি কৰাওক। যদি বেগী অচেতন হৈ থাকে তেন্তে বমি নকৰাবাব। ২) যদি কাপোৰ আৰু ছাল দৃষ্টিত হয় তেন্তে কাপোৰ সলাই পেলাব আৰু চাবোন তথা প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ পানীৰে দেহৰ অংগবোৰ ভালদৰে ধুব। ৩) যদি চকুত লাগে, তেন্তে প্ৰায় ১০-৫ পৰা ১৫ মিনিটমান সময় প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ পানী চকুত মাৰিব। ৪) যদি উশাহত ভিতৰলৈ যায়, তেন্তে বেগীক বিশুদ্ধ বতাহ হালাল কৰা চ'ইলে নিয়ক। যদি উশাহ লোৱাত কষ্ট হয়, তেন্তে কৃত্ৰিম শ্বসন প্ৰক্ৰিয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰক। তত্ক্ষণিকে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক।

বিষ-প্ৰতিষেধক: কোনো নিৰ্দিষ্ট প্ৰতিষেধকৰ বিষয়ে জনা নাযায়। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা কৰাওক।

ব্যৱহৃত পাত্ৰৰ নিষ্পত্তি:

১) পেকেটবোৰ ভাঙি-ছিঙি কসটিপুৰ ঠাইৰ পৰা আঁতৰত পুতি পেলাব লাগে।

২) ব্যৱহৃত পাত্ৰসমূহ পুনৰ ব্যৱহাৰ নহ'বৰ বাবে ব্যৱহিত ৰ'ব নোৱাৰে।

৩) বাচাবৰ্ষা আৰু পানী প্ৰদূষিত হোৱাৰ ঝুকিপৰা কোনো কৰিবৰ বাবে পেকেটবোৰ বা খালি কোনো সামগ্ৰী আৰু মেছিল তথা পাত্ৰবোৰ তথা পানীয়িনি নিবাপদভাৱে পলোৱা লাগে।

সংগ্ৰাহনাৰ অৱস্থা:

১) অপকৃণনাশক থকা পেকেটবোৰ অন্য সামগ্ৰী বিশেষকৈ খাদ্যৰ বস্তু থোৱা কোঠালি বা চৌহদৰ পৰা আঁতৰত সুকীয়া কোঠালি বা চৌহদত ভাগ কৰি থোৱা উচিত বা ল'ৰা-ছোৱালীয়ে নোপোৱাকৈ অথবা অপৰিষ্টিত ব্যক্তিৰ পৰা দূৰৈত অপকৃণনাশকৰ পৰিমাণ আৰু প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সুকীয়া আলমাৰিত তলা মাৰি থোৱা উচিত।

২) অপকৃণনাশক সংগ্ৰহ কৰি ৰখা কোঠালি বা চৌহদ ভালদৰে নিৰ্মিত, শুকান, ভালদৰে পোহৰ পৰা আৰু বতাহ হালাল কৰিব পৰাকৈ তথা যথেষ্ট আহল-বহল হোৱা উচিত যাতে বাম্প লাগি থকিবৰ নাই হৈ নাযায়।

বাসায়নিক গঠন:

বাইস্পাইবিবেক ছ'ডিয়াম সক্ৰিয় উপাদান : ১০.০০% ডব্লিউ /ডি

এডজুভেন্ট-এ (পলিঅকছাইলেট অক্সাইড ডিনাইট্ৰোচিড অব এ চিহ্নেটিক এলক'হল) ৩১.৯০% ডব্লিউ /ডি

এডজুভেন্ট-বি (পলিঅক্সিইথাইলিন পলিআঁৰ প্ৰপাইলিন্‌ চিহ্নেটিক এলক'হল হৈছে ইথাৰ) ৫৩.২০% ডব্লিউ /ডি

প্ৰপাইলিন গ্ৰাইকল: ২.০০% ডব্লিউ /ডি

এলিউমিনিয়াম অক্সাইড চি: ১.৫০% ডব্লিউ /ডি

চিলিকনকেওচ-৫৩৬ : ১.০০% ডব্লিউ /ডি

টেবিলাইজাৰ : ১.০০% ডব্লিউ /ডি

পানী : তৈয়াৰ কৰিবলৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণ

মুঠ: ১০০.০০% ডব্লিউ /ডি

সতৰ্কতা : এই লেবেল অথবা লিফলেটে উল্লেখিত নিৰ্দিষ্ট ফসল ব্যতীত অন্য কোনো ফসলৰে ওপৰ এই উদ্ভিদনাশকটিৰ প্ৰয়োগ অনুপযোক্ত।

নিৰ্মাতা : স্বাল কৰ্পোৰেশন লি., পঞ্জীকৃত কাৰ্যালয় : ইউনিএল লিমিটেড, বেডিমনী টেৰেচ, ১৬৭, ডাঃ এনি বেচেণ্ট ৰোড, ওৰলী, মুম্বাই-৪০০ ০১৮, মহাৰাষ্ট্ৰ.

ரைஸ்பாக்

ஆலைக்கொல்லி

பிஸ்பைரிபாக் சோடியம் 10% W/V SC

பிஸ்பைரிபாக் சோடியம் 10% W/V SC என்பது ஒரு பல்வகை தோன்றும் புற்கள், கோரைகள் மற்றும் அகல இலைக் களைகள் தோன்றியவுடன் ஆற்றலுடன் கட்டுப்படுத்தும் களைக்கொல்லி.

பரிந்துரைகள் :

பயிர் (கள்)	களைகளின் பெயருக்கு ஏற்ப	அளவு / ஹெக்டேருக்கு		நீர்க்கரைசலின் அளவு (லிட்.)	கடைசி தெளிப்பிலிருந்து அறுவடைக்கு இடைப்பட்ட காத்திருக்கும் காலம் (நாட்கள்)
		தீவிர களைகள் (கிராம்)	மிதமான களைகள் (மிலி)		
நெல் (நாற்று)	எக்கினோகுளோவா குருங்கலி, எக்கினோகுளோவா கோலோனா, இரோகை ஒரைசாலிஸ், லைலைபாரப் பிலைபாரிஸ், லைலைபாரப் ஜூபாடா, ஃபிம்பிரிஸ்டிலிஸ் மிலியாசியா, ஃபிம்பிரிஸ்டிலிஸ் மிலியாசியா ஜூபாடா, ஆல்டர்னாந்தெரா பிலாக்ஸெரா, ஆக்சிஜாஸ்ஸாரா ஹெர்பாஸியா, ஹைட்ரோஸிலிஸ் ஹைட்ரோஸிலிஸ்	20	200-250	300	தெளிப்பு மற்றும் அறுவடைக்கு இடைப்பட்ட காலம் >78 நாட்கள்
நெல் (நடவு செய்தது)		20-25	200-250	300	
நெல் (நேரடி விதைப்பு)		20-25	200-250	300	

உபயோகிப்படுத்தக வழிமுறை: உபயோகிப்படுத்த முன்பு பாட்டிலை நன்றாக குலக்கவும். தேவையான அளவு களைக்கொல்லி மருந்தை எடுத்துக்கொண்டு சிறிதளவு தண்ணீரில் சேர்த்து நன்றாக கலக்கவும். மீள்வர் தெளிப்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து மீண்டும் நன்றாக கலக்கவும்.

தெளிக்கும் முறை: களைக்கொல்லி தெளிக்கும் முன்பு வயலில் நீர் வடியச் செய்ய வேண்டும். தெளிக்கு முந்தைய பிறகு மீண்டும் நீர் பாயச்ச வேண்டும். தெளிப்புக்கு பிறகு குறைந்தது 10 நாட்களுக்கு வயலில் தண்ணீர் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.

தெளிப்பு விநியோகம்: காற்று லேசாக திசையில் சீராக தெளிக்கவும். களைகள் மீது முற்றிலுமாக படும்படி தெளிக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும்.

தெளிப்படுத்தகூடிய நேரம்:

நாற்றங்காலுக்கான விதைத்த பிறகு 10-12 நாட்களில் தெளிப்பது: நாற்றங்காலுக்காக விதைத்த பிறகு 10-12 நாட்களில் தெளிப்பது உகந்த நேரம் ஆகும் மற்றும் நடவு செய்யப்பட்ட பிறகு 10-14 நாட்களில் ஏற்கனவே களைகள் வெளிப்பட்டு 3-4 இலைகள் விட்ட நிலையில் மண் மற்றும் வானிலை காரணிகள் பொறுத்து தெளிக்கவும்.

நேரடியாக விதைத்தக்கப்பட்ட நெல்: நேரடியாக விதைத்தக்கப்பட்ட நெற்பயிருக்கு விதைத்த பிறகு 15-25 நாட்களில் தெளிக்கவும்.

பயிர் பாதுகாப்பு உபகரணம்: அதிக கொள்ளளவு தெளிப்பான்களான நாப்சாக் தெளிப்பான்,ப்பாட், பேன் அல்லது ஜெட் நோஸில் பொருத்தப்பட்டபடி பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. உணவுப் பண்டங்கள், மற்றும் கால்நடைகளுக்கு அப்பால் வைக்கவும். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் சருமத்தில் படுவதைத் தவிர்க்கவும். 3. தெளிப்புப்படைம் உட்கவாசிக்கப்படுவதை தவிர்க்கவும். 4. தெளித்து முடித்த பிறகு மாகபட்ட ஆடைகள் மற்றும் உடல் பாகங்களை நன்றாக கழுவவும். 5. தெளிக்கும் போது புகைபிடித்தல், குடிக்கவும் மருந்தில், உண்ணுதல் மற்றும் மெல்லுதல்கூடாது.

விஷபேப்புட்டத்தகான அறிகுறிகள்: பலவீனம், உமிழ்நீரை வாந்தி எடுத்தல், மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு.

முதலுதவி: 1. விழுங்கப்படடிருந்தால், தொண்டைக்குள் விரலைவைத்து வாந்தி எடுக்கத் தூண்டவும். தொயாளி மயக்க நிலையில் இருக்கும் போது வாந்தி எடுக்கத் தூண்டக்கூடாது. 2. ஆடை மற்றும் சருமம் மாக பட்டிருந்தால் ஆடையை களைந்துவிட்டும் மற்றும் மாக பட்ட சருமத்தை அதிக அளவு சோப்பு மற்றும் தண்ணீர் கொண்டு கழுவவும். 3. கண்களில் மாக பட்டிருந்தால் சுமார் 10 முதல் 15 நிமிடங்களுக்கு அதிக சலவை/கத்தமான தண்ணீர் கொண்டு பாய்ச்சவும். 4. உட்கவாசிக்கப்பட்டிருந்தால் நோயாளியை நல்ல காற்றோட்டம் உள்ள பகுதிக்கு அழைத்துச் செல்லவும். கவாசிக்கவில்லை என்றால் காற்றுப்பாதைகளை கத்தம் செய்யவும் மற்றும் வெளிக்காற்றை கொடுக்கவும். உடனடியாக மருத்துவ உதவிநாடவும்.

மாற்று மருந்து: குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து ஏதும் அறியப்படவில்லை. அறிகுறிக்குத்தக்க சிகிச்சை அளிக்கவும்.

உபயோகப்படுத்தியப் கொள்களன் அப்புறப்படுத்தத்துல்:

1. பேக்கேஜுகள் வசிப்பிடங்களுக்கு அப்பால் உடைத்து புதைக்கப்பட வேண்டும்.
2. பயிகப்படுத்தப்பட்ட கொள்கலன்கள் மற்றும் பேக்கேஜுகள் அதன் மறு உபயோகத்தை தவிர்க்க வெளியே விட்டு வைக்கக்கூடாது.
3. பேக்கேஜு அல்லது உபரிப் பொருள்கள் மற்றும் இயந்திரங்களையும் கொள்கலன்களையும் கழுவிய நீர் இவற்றை கற்றுக் சூழல் அல்லது நீர்நிலை மாக பாதுகாவாது பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

செயப்படு நிலையங்கள்:

1. களைக்கொல்லி அடங்கிய பேக்கேஜுகள், இதர பொருள்கள் குறிப்பாக உணவுப்பண்டங்கள் செமிக்கப் பயன் படுத்தப்படும்.அதைகள் அல்லது இடங்களுக்கு அப்பால் தனி அறைகள் அல்லது இடங்களில் செமித்து வைக்கப்பட வேண்டும் அல்லது களைக்கொல்லியின் அளவு மற்றும் தன்மை பொருத்து தனி அலமாரிகளில் பூட்டி வைக்கப்பட வேண்டும்.
2. களைக்கொல்லி கேமித்து வைக்கப் பயன்படும் அறைகள் அல்லது இடங்கள் நன்றாக கட்டப்பட்டதாக, நல்ல வெளிச்சமுள்ளதாக, காற்றோட்டமுள்ளதாக, மற்றும் காற்றுடன் கலந்து மாகபடுவதை தவிர்க்க போதுமான அளவுடைமுடையுடுக்க வேண்டும்.

இரசாயனக் கலவை:

பைஸ்பைரிபேக் சோடியம் தீ.மு:	10.00% w/v
துணை-அ (பாலிஅல்கைல்கள் ஆக்ஸைடு டிஎரமேடிவ் ஆப் சிந்தெடிக் அல்கஹால்):	31.90% W/V
துணை-ஆ (பாலிஆக்ஸிஎதிலீன் பாலிஆக்ஸி புரோபைலீன் சிந்தெடிக் அல்கஹால் ஈதர்):	53.20% W/V
புரோபைலீன் கிளைகால்:	2.00% W/V
அலுமினியம் ஆக்சைடு C:	1.50% W/V
சிலிகனைன் கேஎச் -506:	1.00% W/V
ஸ்டெபிலைசர்:	1.00% W/V
தண்ணீர்:	தேடக % W/V
மொத்தம்:	100.00% W/V

எச்சரிக்கை: இந்த லேபிளில்/சிற்றேட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயிர்கள் தவிர வேறு பயிர்கள்மீது உபயோகிக்கக் கூடாது.

விற்பனைக்கு வெளியீடு : ஸ்வால் கொர்பூரேஷன் லிமிடெட்,
புரிய அலுவலகம் : யூபிஎல் லிமிடெட், ரெடிமனி டெரேஸ்,
167, டாக்டர் அனிபெசன்ட் ரோடு, வர்லி, மும்பை-400 018, மஹாராஷ்ட்ரா.

ৰাইস্ব্যাক

অণ্ডৰ্বৃত্তবাহী কবুজাৰাশক

বিচ্ছ্ৰিবিচ্যাক্ সোৰেডিয়াম 10% W/V SC

বিচ্ছ্ৰিবিচ্যাক্ সোৰেডিয়াম 10% W/V SC মঁকৰ্ষই সকৰত কৰ্ষকাৰকসমূহৰ্নাদ্যু ইয়াৰ্ব্বৃত্তবৃত্তি হাৰুবু, চৰৰ মাত্ৰ আৰু এৰেডাৰ কৰ্ষেডাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ্নাদ্যু সৰ্বোত্তমকৰ্ষ্যৰ্নাদ্যু।

উপযোগ:

| শস্য | ব্যৱহৃত বাধাজনক নাম | বৃদ্ধি হেক্টৰত গ্ৰাম (গ্ৰা.) | সাধাৰণ পানী (লি.) | অধিক বিষ্টৰ পৰ্যন্তৰ পানীৰ পৰিমাণ (লি.) | অধিক বিষ্টৰ পৰ্যন্তৰ পানীৰ পৰিমাণ ছাৰ্ব্বৰ্ব্বৰ্ব্ব