inside

240mm

80mm. | 80mm. | 80mm.

285mm.

ਚੁਣਿੰਦਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ
ਸਲਫੋਸਲਫੂਰਾਨ 75%+ਮੇਟਸਲਫੂਰਾਨ ਮੇਥਾਈਲ 5% ਡਬਲਯੂ ਜੀ
(ਸਟਾਸਟ)

ਸਲਫੋਸਲਫੂਰਾਨ 75% + ਮੇਟਸਲਫੂਰਾਨ ਮੇਥਾਈਲ 5% ਡਬਲਯੂ ਜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚ ਉਗਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਕੁੱਲ ਅਤੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗਰ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਕ ਚੋਣਵੀਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਹੈ।

ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਫਾਰਮੂਲਾ :

ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ (ਘ/ਘ)	ਮਾਤਰਾ (ਘ/ਘ)
1) ਸਲਫੋਸਲਫੂਰਾਨ ਸ਼੍ਰਿ. ਤੱ.	: 75.00
2) ਮੇਟਸਲਫੂਰਾਨ ਮੇਥਾਈਲ ਸ਼੍ਰਿ. ਤੱ.	: 05.00
3) ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ	
i) ਸੋਡੀਅਮ ਨੈਫਥਾਲੀਨ ਸਲਫੋਨੇਟ	: 02.50
ii) ਲਿਗਨੋਸੁਲਫੋਨੇਟ	: 00.10
iii) ਪੋਟਾਸੀਅਮ ਸਾਈਕਲੋਕਲੋਨੇਟ	: 04.00
4) ਡੀਫੋਮਰ	
ਟੈਲੋ ਸੋਪ	: 00.20
5) ਵੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ	
i) ਸੋਡੀਅਮ ਡਾਈਅਲਕਾਈਲ ਨੈਫਥਾਲੀਨ ਸਲਫੋਨੇਟ	: 00.10
ii) 3 ਈਓ ਅਲਕਾਈਲ (ਸੀ$_{12}$-ਸੀ$_{15}$) ਈਥਰ ਸਲਫੇਟ	: 04.20
6) ਸਸਪੇਂਡਿੰਗ ਏਜ	
ਈਥੀਲੀਨ ਔਕਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਪੈਲੀਨ ਔਕਸਾਈਡ	: 01.70
7) **ਐਲਫਾ - ਅਲਕਾਈਲ (ਸੀ$_{12}$-ਸੀ$_{15}$) ਓਮੇਗਾ-ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਪੋਲੀ (ਅਲਈਥੀਲੀਨੇਟ) ਮਿਕਸਚਰ**	: 00.10
8) ਸਿਲੀਕੋਨ ਡੀਫੋਮਰ	: 00.10
9) ਫਿਲਰ (ਪ੍ਰੇਸਿਪਿਟੇਡ ਸਿਲਿਕਾ)	ਤੋਲੀਦੀ ਮਾਤਰਾ
ਕੁੱਲ	100.00

ਟਿੱਪਣੀ : ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚ 500 ਮਿ.ਲੀ. ਸਰਫੈਕਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਪ੍ਰੇਹਾਰਾਸ਼ ਛਿੜਕਣ ਵੇਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਵਰਤੋਂ : ਇਸ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪੋਟਾ ਕਿਸੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 30-35 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ 2-4 ਪੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ।

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ :

ਫ਼ਸਲ	ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ	ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ			ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਦਿਨ)
		ਗ੍ਰਿ.ਤੋ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਨੁਸਖਾ (ਗ੍ਰਾ.)	ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲੀਟਰ)	
ਗੋਧਾ	ਫਲਾਰਿਸ ਮਾਈਨਰ, ਰਿਊਮਿਕਸ ਐਸਪੀ., ਚੇਨੋਪੋਡੀਅਮ ਐਲਬਮ., ਐਨਾਗੈਲਿਸ ਅਰਵੈਨਸਿਸ, ਮੇਡੀਕੇਗੋ ਡੈਂਟੀਕੁਲਾਟਾ, ਕੋਰੋ-ਨੋਪਸ ਡਿਡੀਮਸ	30+2	40.0	250-500	110

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ :

1) ਏਥੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਰਾਈ ਆਦਿ ਕਣਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ।
2) ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼-ਇਹ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਕੇਵਲ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ/ਕਪਾਹ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ :

ਮਾਤਰਾ :
ਬੁੱਲੀ ਫ਼ੋਕ ਅਤੇ ਉਗਿਣ ਪੂਰਵ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬੁੱਲੀ ਸੀਮੀ (16 ਗ੍ਰਾਮ) ਵਿਚ ਵੇਰਵਾ ਕਰੀਨ ਵਿਚ ਵਰਤੋ।

ਘੋਲ ਤਯਾਰੀਆਂ :

1) ਸਲਫੋਸਲਫੂਰਾਨ 75% + ਮੇਟਸਲਫੂਰਾਨ 5% ਡਬਲਯੂਜੀ ਦੀ ਸੀਮੀ (16 ਗ੍ਰਾਮ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਛੇ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੋਲੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਾਓ।
2) ਫਿਰ ਸਰਫੈਕਟੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ (500 ਮਿ.ਲੀ.) ਉਪਰਲੇ ਘੋਲ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਾਓ।
3) ਇਕ ਵੇਲਣ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਲਗਭਗ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਾਓ ਜਦ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਵਰਤੋਂ :

ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਤਰਲ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਪੈਂਦੇ ਪੰਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਵਾਂਗ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਕ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਸਲਫੋਸਲਫੂਰਾਨ 75% + ਮੇਟਸਲਫੂਰਾਨ ਮੇਥਾਈਲ 5% ਡਬਲਯੂ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘੋਲ ਵੇਲਣ ਦਾ ਹਰ ਹਿੱਸਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛਿੜਕਾਅ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ 2-4 ਪੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 30-35 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਛਿੜਕਾਅ ਲੋੜ ਪਵੇ।

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ :

1) ਸਲਫੋਸਲਫੂਰਾਨ 75% + ਮੇਟਸਲਫੂਰਾਨ ਮੇਥਾਈਲ 5% ਡਬਲਯੂ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਤਰਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਲਫੋਸਲਫੂਰਾਨ 75% + ਮੇਟਸਲਫੂਰਾਨ ਮੇਥਾਈਲ 5% ਡਬਲਯੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰੋ।
2) ਨਿਰਦ ਬਲੋਅਰ (ਪਾਊਡਰ ਸਪ੍ਰੇਅਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
3) ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾਂ ਕਪੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਂਟ ਆਂਗਣੀ, ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼, ਪੂਰੀ ਪਤਲੂਨ ਅਤੇ ਬੂਟ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
4) ਜਾਣੂ ਛਿੜਕਾਅ ਕੇਲ ਕੁੱਦਣ-ਪਤਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਨ ਡਿੱਗਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਤੁਰ ਵਿਚ ਜਾਹ ਨ ਖਾਣ ਤੇ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਾਵਧਾਨ ਇਸ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
5) ਖਾਣ ਅਤੇ ਤੇ ਪੀਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਤੇ ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੰਗੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
6) ਇਸ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜੋ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
7) ਇਸ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਪੰਪ ਅਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਤਥਾ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਹਿਰ ਖੜ੍ਹਣ ਦੇ ਲਕਸ਼ :
ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਲਾਰ ਡਿਗਣੀਆਂ, ਦਸਤ ਹੋਣੇ, ਅੰਤੜੂ ਵਗਣੇ, ਸਾਹ ਔਖਾ ਆਉਣਾ ਆਦਿ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫੌਰੀ ਸਹਾਇਤਾ :
ਚੰਗੀਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਤਕ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣੇ ਅਤੇ ਜੇ ਜਲਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਜੇ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਾਬਣ ਤਥਾ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫੌਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ :
ਚੰਗੀਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸਾਂਭ - ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਤਾਂ :

1) ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲਾਂ ਜੋਗੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੋਟਰ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨਿਆਂ ਜਾਂ ਅਨਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਖਰੀ ਸਮਾਨਿਆਂ ਜਾਂ ਅਨਾਜਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੋਟਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
2) ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਰੋਟਰ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਲਿਟ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ, ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਰੋਟਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ :

1) ਉਤਪਾਦਕ, ਫ਼ਾਰਮੂਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਛਿੜਕਾਅ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੱਬਿਆਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਬਚੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਰੋਟਰ ਨੂੰ ਸਹੀਅਮਤ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨ ਹੋਵੇ।
2) The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3) Packages shall be broken and buried away from habitation.

CAUTION: Not to be used on crops other than specified on this label / leaflet.

ਵਿਨ੍ਹਣੇਤਾ:
ਸਵਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿ.
੧੬੭, ਡਾ. ਐਨੀ ਬੇਸੰਟ ਰੋਡ, ਵਰਲੀ, ਮੁੰਬਈ - ੪੦੦ ੦੧੮

SELECTIVE HERBICIDE
SULFOSULFURON 75%+METSULFURON METHYL 5% WG
(SATASAT)

Sulfosulfuron 75% + Metsulfuron Methyl 5% WG is a selective post-emergence herbicide for the effective control of *Phalaris minor* and broad leaf weeds in wheat crop.

CHEMICAL COMPOSITION :

Composition	Content (%w/w)
1) **Sulfosulfuron a.i.**	: 75.00
2) **Metsulfuron methyl a.i.**	: 05.00
3) **Dispersant**	
i) Sodium Naphthalene Sulfonate	: 02.50
ii) Lignosulfonate	: 00.10
iii) Potassium Polycarboxylate	: 04.00
4) **Defoamer**	
Tallow soap	: 00.20
5) **Wetting agent**	
i) Sodium dialkyl naphthalene Sulfonate	: 00.10
ii) 3 EO alkyl(C_{12}-C_{15}) ether sulfate	: 04.20
6) **Suspending aid**	
Ethylene oxide-Propylene oxide	: 01.70
7) **Alpha-alkyl (C_{12}-C_{15})- Omega-hydroxypoly (oxyethylene) mixture**	: 00.10
8) **Silicone defoamer**	: 00.10
9) **Filler (Precipitated Silica)**	q.s.
Total	100.00

NOTE : Co-pack contains 500 ml of surfactant, which is to be used at the time of spraying of herbicide.

APPLICATION :
This herbicide is recommended for control of following weeds in the wheat crop. The ideal time for application of this herbicide is 30-35 days after sowing of Wheat crop when the weeds are in the 2-4 leaf stages.

RECOMMENDATION FOR USE :

CROP	NAME OF WEEDS	Dosage per Hectare			Waiting period in (Days)
		a.i. (g)	Formulation (g)	Quantity of Water in litre	
WHEAT	Phalaris minor, Rumex sp., Chenopodium sp., Melilotus alba, Anagallis arvensis, Medicago denticulata, Coronopus didymus	30+2	40.0	250-500	110

PRECAUTION :
1) Dicot crops like mustard, pulses etc. should not be grown as intercrop in wheat.
2) Crop rotation recommendation-this herbicide is recommended for use ONLY in wheat-rice/cotton rotational areas.

DIRECTION FOR USE :
Dose : Use the pouch contents(16g) for one acre of land for the effective control of *Phalaris minor* and other weeds listed above.

Mixing :
1. Dissolve the entire content of Sulfosulfuron 75% + Metsulfuron Methyl 5% WG pouch (16g) in six litres of water and mix thoroughly.
2. Then add the entire content of surfactants (500 ml) to the above solution and mix thoroughly with a stick.
3. Dilute the solution with 100 litres of water to uniformly spray one acre.

APPLICATION :
This should only be applied as liquid spray. Use a knapsack sprayer equipped with flat fan nozzle. As with any herbicide, calibrate your sprayer prior to application to ensure the use of adequate spray solution. For best results, apply Sulfosulfuron 75% + Metsulfuron Methyl 5% WG when the weed plants are at 2-4 leaf stages, normally 30-35 days after sowing of wheat. For best results ensure a uniform application of the spray solution over the treated area.

PRECAUTIONS FOR USES :
1. Sulfosulfuron 75% + Metsulfuron Methyl 5% WG should only be used as a liquid spray. Do not broadcast Sulfosulfuron 75% + Metsulfuron Methyl 5% WG.
2. Do not use a mist blower (power spray).
3. The spray man should use appropriate protective clothing like hat, long sleeved shirt, long pants and shoes.
4. Avoid contact with eyes and skin when handling the concentrates spray solution. Avoid inhalation of spray mist. Wash thoroughly with soap and water after handling. Do not eat, drink or smoke during application. Remove contaminated clothes and wash before reuse. Do not reuse the empty containers.
5. Wash hands & exposed skin with soap and water before meals and after work.
6. Dicot crops like mustard, gram etc. should not be grown as intercrop in wheat.
7. After spraying this herbicide, the sprayer and utensils should be thoroughly cleaned with plenty of soap and water.

SYMPTOMS OF POISONING :
The product may cause excessive salivation, diarrhoea, lacrimation, laboured breathing etc.

FIRST AID MEASURE :
Treat symptomatically. In case of accidental exposure to eye wash eyes with clean water for 15 minutes and see a doctor if irritation persists. In case of skin contact wash exposed area with soap and water.

ANTIDOTE :
Treat symptomatically.

CONDITIONS TO BE SPECIFIED FOR STORAGE OF HERBICIDES :
1) The package containing herbicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the herbicides.
2) The rooms or premises meant for storing herbicides shall be well-built, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimension.

DISPOSAL OF USED PACKAGES, SURPLUS MATERIALS AND WASHINGS OF HERBICIDES :

1) It shall be the duty of the manufactures, formulators or herbicide operators to dispose packages or surplus materials and washings in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.
2) The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3) Packages shall be broken and buried away from habitation.

CAUTION: Not to be used on crops other than specified on this label / leaflet.

Marketed by:
SWAL CORPORATION LTD.
167, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400 018.

SATASAT®

Sulfosulfuron 75% + Metsulfuron Methyl 5% WG

Herbicide

Manufactured by : UPL Limited, Regd. office: 3-11, G.I.D.C., Vapi - 396 195, Gujarat.

Marketed by: SWAL CORPORATION LTD., C/o. **UPL LTD.**, Readymoney Terrace, 167, Dr. A. B. Road, Worli, Mumbai - 400 018, Maharashtra.

निर्माता : यूपीएल लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : ३-११, जी.आई.डी.सी., वापी-३९६ १९५, गुजरात.

विपणनकर्ता: स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
C/o. **यूपीएल लिमिटेड**, रेडिमनी टैरेस, १६७, डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई-४०० ०१८, महाराष्ट्र.

FOR SUGGESTIONS AND COMPLAINTS, CONTACT: MANAGER, (CUSTOMER CARE) - SWAL CORPORATION LTD., C/O. UPL LTD., READYMONEY TERRACE, 167, DR. A. B. ROAD, WORLI, MUMBAI - 400 018, MAHARASHTRA. TEL NO.: 1800-233-2020, EMAIL: CUSTOMER.CARE@SWAL.IN

SWAL

---

front & back side

240mm

80mm. | 80mm. | 80mm.

285mm.

ਚੁਨਿੰਦਾ ਖਰਪਤਵਾਰਨਾਸ਼ਕ
ਸਲਫੋਸਲਫੂਰਾਨ 75% + ਮੇਟਸਲਫੂਰਾਨ ਮਿਥਾਈਲ 5% ਡਬਲਯੂ ਜੀ
(ਸਟਾਸਟ)

ਸਲਫੋਸਲਫੂਰਾਨ 75% + ਮੇਟਸਲਫੂਰਾਨ ਮਿਥਾਈਲ 5% ਡਬਲਯੂ ਜੀ, ਇਕ ਚੁਨਿੰਦਾ ਖਰਪਤਵਾਰਨਾਸ਼ਕ ਨਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਣਕ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਫ਼ੌਲੀ ਘਾਹ ਅਤੇ ਚੌੜੇ ਪਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖਰਪਤਵਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲੈ ਕਿਤੇ ਕਿਤਾ ਜਾਣ ਹੈ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਬੰਦਰਤ :

ਸੰਰਚਨਾ	ਮਾਤਰਾ (%ਮਾਰ/ਮਾਰ)
1) ਸਲਫੋਸਲਫੂਰਾਨ ਸਕਿਰਯ ਤਾਰ	: 75.00
2) ਮੇਟਸਲਫੂਰਾਨ ਮਿਥਾਈਲ ਸਕਿਰਯ ਤਾਰ	: 05.00
3) **ਡਿਸਪਰਸੈਂਟ**	
i) ਸੋਡਿਯਮ ਨਾਫਥਾਲੀਨ ਸਲਫੋਨੇਟ	: 02.50
ii) ਲੀਗਨੋਸਲਫੋਨੇਟ	: 00.10
iii) ਪੋਟੇਸਿਯਮ ਪੌਲੀਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਟ	: 04.00
4) **ਫ਼ੋਮ ਨਾਸ਼ਕ**	
ਟੈਲੋ ਸੋਪ	: 00.20
5) **ਸਲਪਤਿਕੁਤਾ ਪਾਸਾਰਕ**	
i) ਸੋਡਿਯਮ ਡਾਈਅਲਕਾਈਲ ਨਾਫਥਾਲੀਨ ਸਲਫੋਨੇਟ	: 00.10
ii) 3 ਈਓ ਅਲਕਾਈਲ (ਸੀ-ਸੀ) ਈਥਰ ਸਲਫੇਟ	: 04.20
6) **ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ ਏਜ**	
ਈਥੀਲੀਨ ਔਕਸਾਈਡ-ਪ੍ਰੋਪੈਲੀਨ ਔਕਸਾਈਡ	: 01.70
7) **ਐਲਫਾ-ਅਲਕਾਈਲ (ਸੀ$_{12}$-ਸੀ$_{15}$) ਓਮੇਗਾ-ਹੈਡ੍ਰੋਕਸੀਪੋਲੀ (ਅਲਈਥੀਲੀਨ) ਮਿਸਚਰ**	: 00.10
8) ਸਿਲੀਕੋਨ ਡਿਫੋਮਰ	: 00.10
9) ਫਿਲਰ (ਪ੍ਰੇਸਿਪਿਟੇਡ ਸਿਲਿਕਾ)	ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ
ਕੁਲ ਜੋਗ	100.00

ਸੂਚਨਾ :
ਫ਼ਲੀ ਡਿਬੇ ਵੇਚ 500 ਮਿ.ਲੀ. ਸੈਟਲਿਕ ਸਰਫੇਕਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਸ ਖਰਪਤਵਾਰਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਸਿਕਾਵ ਕੇ ਸਮਾਂ ਕਿਆ ਜਾਨਾ ਚਾਹਿਏ।

ਪ੍ਰਯੋਗ :
ਸਲਫੋਸਲਫੂਰਾਨ 75% + ਮੇਟਸਲਫੂਰਾਨ ਮਿਥਾਈਲ 5% ਡਬਲਯੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੇਂਦੂ ਕਣਕ ਦੇ ਜਿਨਾਂਹਿਕਤ ਖਰਪਤਵਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲੈ ਕਿਤੇ ਕਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 30-35 ਦਿਨ ਬਾਦ ਜਬ ਖਰਪਤਵਾਰ 2-4 ਪਤੇ ਕੀ ਹਤਾ ਸੇ ਹੋ।

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ :

ਫ਼ਸਲ	ਖਰਪਤਵਾਰ ਦਾ ਸਾਸਾਧਾਰਣ ਨਾਮ	ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ			ਖਰਪਤਵਾਰ ਚਿਤਰਨੇ ਮੌਕੇ ਕਰਨੇ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਬੀਚ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ (ਦਿਨ)
		ਸਕਿਰਯ ਤਾਰ (ਗ੍ਰਾ.)	ਸੇਂਟੀਮ (ਗ੍ਰਾ.)	ਪਾਣੀ (ਲਿ.)	
ਕੇਂਦੂ	ਖਰਪਤਵਾਰ ਦਾ ਸਾਸਾਧਾਰਣ ਨਾਮ, ਰਮੇਕਸ ਸਪਾਈ., ਚਿਨੋਪੋਡੀਅਮ ਐਲਬਮ., ਐਨਾਗੈਲਿਸ ਅਰਵੈਨਸਿਸ, ਮੇਡੀਕੇਗੋ ਡੇਂਟੀਕੁਲਾਟਾ, ਕੋਰੋਨੋਪਸ ਡਿਡੀਮਸ, ਮੇਲੀਲੋਟੋ ਐਲਬਾ, ਐਨਾਗੈਲਿਸ ਅਰਵੈਨਸਿਸ, ਮੇਡੀਕੇਗੋ ਡੇਂਟੀਕੁਲਾਟਾ, ਕੋਰੋ - ਨੋਪਸ ਡਿਡੀਮਸ	30+2	40.0	250-500	110

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ :
ਖਰਪਤਵਾਰਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂਕਤ ਤਾਂ ਦਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ। ਹਵਾਈ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਬਾਦ ਸਲਫ਼ਰ ਅੰਧਾਧੰਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ। ਹਵਾਈ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਬਾਦ ਸਲਫ਼ਰ ਅੰਧਾਧੰਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ। ਹਵਾਈ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਬਾਦ ਖਾਲੀ ਡਿਬੇ ਕੀ ਜਾਣ ਕਰ ਦੇ।

ਸੂਚਨਾ :
1 ਸਲਸੀ, ਦਾਲ ਇਤਯਾਦੀ ਜੇਤੇ ਬੀਤੇ ਖਰੀ ਜਾਣੇ ਫ਼ਸਲ ਕੇਂਦੂ ਕੇ ਸਾਥ ਨ ਹਾਯਾਂ।
2 ਫ਼ਸਲ ਚਕ੍ਰ ਸਿਫਾਰਸ਼, ਇਸ ਖਰਪਤਵਾਰਨਾਸ਼ਕ ਕਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਿਰੇ ਕੇਂਦੂ ਕੇ ਬਾਦ ਥਾਨ ਕਾ ਕਯਾਸ ਤਰਾਨੇ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਨਾ ਚਾਹਿਏ।

ਹਦਾਇਤ ਕੇ ਮਿਤਾਬਕ ਵਰਤੋਂ :

ਮਾਤਰਾ :
ਸਲਫੋਸਲਫੂਰਾਨ 75% + ਮੇਟਸਲਫੂਰਾਨ ਮਿਥਾਈਲ 5% ਡਬਲਯੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਊਚ ਕੇਂਦੂ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰਪਤਵਾਰ ਕੇ ਕਾਰਗਰ ਕੇਂਦ ਕਿਆਂ ਕੇਂਦੂ ਕਿਆ ਜਾਨਾ ਚਾਹਿਏ।

ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ :
1) ਸਲਫੋਸਲਫੂਰਾਨ 75% + ਮੇਟਸਲਫੂਰਾਨ ਮਿਥਾਈਲ 5% ਡਬਲਯੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਊਚ ਕੇਂਦੂ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰਪਤਵਾਰ ਕੇ ਕਾਰਗਰ ਕੇਂ