FRONT SIDE

210mm.

285mm.

PIROXOFOP - PROPANYL 15% WP
CLODINAFOP - PROPARGYL 15% WP

TOPPLE WH

(POST EMERGENCE HERBICIDE)

This is a post emergency herbicide with excellent control of most of the important grass weed species in small grain cereals such as wheat. It contains 150 gms of Clodinafop-Propargyl (R) - 2 - [4-[(5-chloro)-3-fluro-2-pyridinyl) oxy] phenoxy]-propanoic acid propanyl ester per kilogram of wettable powder formulation.

Application :

This herbicide is recommended for the control of following grassy weeds in wheat:

Crop	Common name of weed	Dosage / ha g.a.i.	Dosage / ha Formulation (gm)	Dosage / ha Dilution in water (lts)	Waiting period from last spray to harvest day
Wheat	*Phalaris minor* (Canary grass)	60	400	375-400	110

Timing of application :

This herbicide is recommended for post emergency application which is about 30-35 days after sowing of wheat crop. (When *Phalaris minor* is 3-4 leaf stage).

Best results are obtained by applying this herbicide when the majority of the grass weeds have emerged and are actively growing e.g. under warm, moist conditions.

This herbicide has no residual activity and therefore grass weeds emerging after application will not be controlled. Do not apply if rainfall is expected within 2 hours. **TOPPLE** WH has no activity against Broad leaved weeds.

Mode of Uptake :

This herbicide is taken up through leaves of grass weeds. Active growth of susceptible grasses ceases within 48 hours after application. Symptoms are observed within one to three weeks depending on environmental condition and species involved. Decay of nodes and growing points is visible with young leaves showing chlorosis followed by necrosis.

Crop Tolerence :

Excellent crop tolerance including a double safety margin has been observed in wheat when applied between the 3 leaf stage and stem longation of the cereals. **TOPPLE** WH is not recommended for use in barley and oats.

Re-cropping flexibility :

This is quickly degraded in the soil and has little or no soil activity. There are no recropping restrictions.

Application Technique :

TOPPLE WH can be applied through knapsack and or hand held applicators.

The minimum water volume to be used is 375 lts per ha. This is also available in unit dose sized water soluble bags.

The knapsack sprayer should be fitted with 50 mesh or large size nozle screens.

Preparation of the spray liquid :

a. Mixing outside the knapsack : It is recommended to first mix this herbicide with clean water in a large container of sufficient size such that the complete number of knapsack loads that are required for the spraying are prepared at one time. Fill the container 1/3 to 1/2 full of clean water and add **TOPPLE** WH. Gently stir until the product has dissolved. Then fill the knapsack spray directly with the mixed solution. The mixed solution must be at the final concentration. Do not make a concentrate stock solution (slurry) which required further dilution in the knapsack later on.

b. Mixing directly into the knapsack sprayer : Fill the knapsack tank 1/3 to 1/2 full of clean water and add the water soluble bag of herbicide. Gently stir until the water soluble bag and its contents fully dissolve and then add the rest of the water to the tank.

Storage :

1) Store away from sun and damp in a well ventilated area apart from food and feed under lock and key. Do not contaminate water, food or feed.
2) Do not stack containers in piles more than 2M high, in order to avoid product compaction.
3) The room should be well lit, well ventilated and under lock and key and sufficient in dimension.

Precautions :

Keep locked up out of reach of children and other unauthorised persons. Avoid any contact of skin, eye or clothing with concentrate or spray mixture. Do not breathe vapour or spray mist. Do not eat, drink or smoke while handling the product. Wash hands and face before doing so. If any indisposition occurs, stop work, follow first aid measures and call a physician. Spray strictly with the wind to prevent prolonged or repeated exposure to the spray mist.

It is advised to wear protective clothing i.e. For preparation : Impermeable gloves, overalls and eyes/face protection. For application : overalls, hat or cap and solid footwear. If contamination occurs with concentrate or spray mixture, immediately wash skin thoroughly, flush eyes several times with abundant fresh water, remove contaminated clothing. After use, thoroughly clean protective equipment and wash entire body and change clothing. Wash contaminated clothing before reuse.

Do not contaminate water used for irrigation or domestic purposes or flowing or stagnant waters by the disposal of product wastes. Do not contaminate food or feed.

The repeated use of any pesticide or with herbicides with the same mode of action could lead to selection of resistant weed. Certain agronomic practices may reduce the likelyhood that resistant weeds will arise. In fields where resistant weeds are suspected, integrated strategies are available to manage such population. For specific recommendations please contact our local representatives.

Disposal of Containers :

Dispose of surplus product on a landfill site approved for pesticides or bury in a safe place away from water supples. Dispose of used containers on a landfil site approved for containers pesticides or bury in a safe place. Do not re-use empty containers for any other purpose.

Poisoning symptoms : Dyspnea, Salivation, Decreased Activity, Eye and Skin irritation may occur.

First - Aid : In case of contact with skin and eyes wash immediately with plenty of water. If inhaled, move to clean air. Seek medical attention if a large volume of concentrate was ingested or if irritation should persist.

Antidote : No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy.

Caution: Not to be used on crops other than specified on this label / leaflet.

Marketed by:
SWAL CORPORATION LTD.
Registered Office: UPL LTD., Readymoney Terrace,
167, Dr A B Road, Worli, Mumbai-400018, Maharashtra

TOPPLE®

PIROXOFOP - PROPANYL 15% WP
CLODINAFOP - PROPARGYL 15% WP

Herbicide

MANUFACTURED BY : UPL LIMITED, REGD. OFFICE: 3-11, G.I.D.C., VAPI-396 195, GUJARAT

MARKETED BY : SWAL CORPORATION LTD., C/O. **UPL LTD.**, READYMONEY TERRACE, 167, DR. A. B. ROAD, WORLI, MUMBAI - 400 018, MAHARASHTRA

निर्माता : युपीएल लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : 3-11, जी.आई.डी.सी., वापी-396 195, गुजरात

विपणनकर्ता : स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, C/o. **यूपीएल लिमिटेड,** रेडिमनी टैरेस, १६७, डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई-४०० ०१८, महाराष्ट्र

FOR SUGGESTIONS AND COMPLAINTS, CONTACT: MANAGER, (CUSTOMER CARE) - SWAL CORPORATION LTD., C/O. UPL LTD., READYMONEY TERRACE, 167, DR. A. B. ROAD, WORLI, MUMBAI - 400 018, MAHARASHTRA. TEL NO.: 1800-233-2020, EMAIL: CUSTOMER.CARE@SWAL.IN

SWAL

BACK SIDE

210mm.

285mm.

पायरोक्साफॉप - प्रोपानील १५% डब्ल्यू. पी.
क्लोडिनाफॉप - प्रोपारजिल १५% डब्ल्यू. पी.

टॉपल डब्ल्यूएच

(फसल उगने के बाद इस्तेमाल करने के लिए खरपतवारनाशक)

यह एक फसल उगने के बाद इस्तेमाल करने के लिए खरपतवारनाशक है जिसकी सिफारिश गेहूँ मे आनेवाले घास जैसे खरपतवारों के नियंत्रण के लिए की गयी है। इसके १ किलोग्राम घोल में १५० ग्राम प्रतिशत क्लोडिनाफॉप प्रोपारजिल जिसका रासायनिक नाम- (आर) -२ [४-[(५-क्लोरों) - ३ फ्लोरो - २ पायरिडिनाइल) ऑक्सी] फेनोक्सी] - प्रोपानोईक एसीड प्रोपानील एस्टर है।

सिफारिश :

यह खरपतवारनाशक की सिफारिश निम्नलिखित गेहूँ में आनेवाले घास जैसे खरपतवारों के लिए की गई है।

फसल	घास के सामान्य नाम	मात्रा/हेक्टर ग्राम सक्रिय तत्व	मात्रा/हेक्टर घोल की मात्रा ग्राम	मात्रा/हेक्टर लीटर पानी मे मिलाया जाए	अंतिम स्प्रे और कटाई के बीच का अंतर (दिवस)
गेहूँ	मंडूसी (गूली डंडा) या फेलारिस मायनर	६०	४००	३७५-४००	११०

छिड़काव का समय :

यह खरपतवारनाशक की सिफारिश गेहूँ के बीज रोपण के ३०-३५ दिन बाद छिड़कने के लिए की गई है, जब मंडूसी के ३-४ पत्ते निकल आ चुके रहते है। इस खरपतवारनाशक का अच्छा असर पाने के लिए सभी घास खरपतवारों के उगने के बाद इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा, जैसे कि वातावरण गरम और हवा में आर्द्रता हो।

यह खरपतवारनाशक के छिड़काव होने के बाद उगनेवाले घास खरपतवारों पर इसका कोई असर नहीं होता। अगर २ घंटो में बरसात होने की संभावना हो तो **टॉपल** डब्ल्यूएच का इस्तेमाल न करें। इसका बड़े पत्तेवाले खरपतवारों पर कोई असर नहीं है।

खरपतवारों में अंदर जाने की प्रक्रिया :

यह खरपतवारनाशक का पत्तों के जरिए खरपतवारों में शोषण होता हैं। छिड़काव के ४८ घंटो बाद खरपतवारों का बढाना रुक जाता है। हरे पत्तों का पीला पड़ना और सूखना और बढ़नेवाले भागों को मरना छिडकाव से १ से ३ हफ़्तों बाद दिखाई पडता है।

फसल की सुरक्षा :

गेहूँ में किए हुए प्रयोग से साबित हुआ है कि **टॉपल** डब्ल्यूएच के इस्तेमाल से गेहूँ पर (३ पत्ते से लेके बड़े गेहूँ के पौधे तक) कोई असर नहीं पडता। बारली और जई पर इस्तेमाल के लिए **टॉपल** डब्ल्यूएच की सिफारिश नहीं की गई है।

बाद में उगनेवाली फसल पर असर :

क्योंकि यह खरपतवारनाशक मिट्टी में ज्यादा देर तक नहीं रहता इसकी वजह से बाद में उगनेवाली फसल पर इसका कोई असाधारण असर नहीं है।

खरपतवारों की शक्ती बड़ने की चुनैती:

लगातार एक ही खरपतवारनाशक के इस्तेमाल होने से खरपतवारों के प्रतिरोधकता की वृद्धी होने की संभावना है। इस वृद्धी को काबूमें लाने के लिए कई अन्य शेती योग्य उपाय योजनाओंके इस्तेमाल की शिफारिश की जा सकती है। खास शिफारिशोंके लिए हमारे प्रतिनिधीसे सहायता ले।

छिड़काव का प्रयोग :

टॉपल डब्ल्यूएच की सिफारिश नैप सैक तथा हाथ से छिड़काव करनेवाले स्प्रेअर के लिए की गई है। अच्छे असर के लिए कम से कम ३७५ लि. प्रति हेक्टर पानी की जरूरत है। **टॉपल** डब्ल्यूएच पानी में घुलनेवाले प्लास्टिक बैग में उपलब्ध है। नैप सैक स्प्रेअर में ५० मेश साईज तथा नोजल जाली बिठाने की आवश्यकता है।

घोल बनाने की प्रक्रिया :

१) नैप सैक स्प्रेअर में डालने के पहले की प्रक्रिया: **टॉपल** डब्ल्यूएच का पूरा घोल एक बडे पात्र में अच्छा पानी लेकर बनाइये जिससे पूरे क्षेत्र का छिड़काव करने के लिए घोल एक ही बार बने जिसे नैप सैक में डालकर छिड़का जा सके। ऐसे घोल बनाने के लिए उस पात्र को १/३ या १/२ पानी से भरें और उसमें क्षेत्र को इस्तेमाल करने के लिए लगनेवाली **टॉपल** डब्ल्यूएच की मात्रा वजन करकें डालें। इस घोल को अच्छी तरह घुमाए ताकि मात्रा अच्छी तरह से घुल जाए। नैप सैक में भरने के लिए इस घोल का इस्तेमाल करें। कॉन्सनट्रेट मात्रा बनाने की सिफारिश नही हैं।

२) नैप सैक में सीधी तरह डालने की प्रक्रिया :
नैप सैक को १/३ या १/२ पानी से भरें। इसमें पानी में घुलनेवाली बैग जिसमें यह खरपतवारनाशक भरा हो ड़ाल दें। अच्छी तरह इस घोल को घुमाइए ताकि अच्छा संमिश्रण तैयार हो। बचा हुआ पानी नैप सैक में डाल के छिड़काव करें।

भंड़ारण :

१) खरपतवारनाशक के पैकेजों को अलग कमरों में रखकर, ऐसे कमरों को अन्य कमरों से दूर रखना चाहिए जहाँ अन्य सामान रखा हो जैसे कि खाद्य पदार्थ या फिर उन्हें अलमारी में तालाबंद रखें।
२) जिन कमरों या स्थानों पर खरपतवारनाशक रखना हो वे अच्छी तरह निर्मित हों, सूखी और हवादार, रोशनीयुक्त हों और उनका आकार भी लम्बा चौडा होना चाहिए ताकि हवा दूषित न हो पाए।
३) पैकेजों का भण्ड़ारण एक के ऊपर रखकर २ मी. उंचाई के ऊपर न करें, इससे अंदर की चीज पर दबाव पड़ने की सम्भावना है।

सावधानियाँ :

बच्चों की पहुँच से दूर रखिए। त्वचा, आंखों तथा कपडों से संपर्क न आने दें। इस उत्पादन को सांस द्वारा अंदर न लें। इसका इस्तेमाल करते समय ना ही खाएं, ना पियें या धूम्रपान करें। इसे उपयोग में लाने के बाद हाथ तथा मुँह अच्छी तरह पानी से धोएं। इसके इस्तेमाल के समय बचाव के कपडे, दस्ताने, मुखौटा, गॉगल्स और बूट पहनें। इसके उपयोग के बाद स्प्रेअर, बाल्टियां तथा अन्य बर्तनों को पानी से रोजाना धोएं। साबुन और भरपूर पानी से हाथ धोए और काम खतम होने पर कपडे बदल लें, दूषित कपडों को भी धोएं, बचे हुए घोल/पदार्थ को स्रोतों, तालाब या पानी के अन्य स्थानों में डालकर उन्हें प्रदूषित न करें। यदि सिफारिश की गई मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो वनजीवन पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा। यदि विषबाधा के लक्षण दिखाई दे तो फौरन डॉक्टर की सलाह लें।

डिब्बों का निपटारा :

१) पर्यावरण का प्रदूषण बचाने के लिए डिब्बे, बचा हुआ घोल/पदार्थ मशीनों की धोवन और खाली डिब्बों का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें।
२) उपयोग किए गए डिब्बें /पैकेजों को वैसे ही बाहर न छोड देना चाहिए। इस प्रकार इनका दुबारा उपयोग बचाया जा सकता है।
३) पैकेजो /डिब्बों को तोड-फोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड देना चाहिए।

विषबाधा के लक्षण : साँस लेने में परेशानी, अधिक लार, कार्यशीलता में कमी होना, आँख व त्वचा में जलन होना, आदि।

प्रथमोपचार : यदि त्वचा और आँखों में लग जाए तो तुरन्त भरपूर पानी से धो डालें। अगर सांस द्वारा अंदर ले लिया हो तो अच्छी स्वच्छ हवा में ले जाए। अगर निगला हो तो भरपूर पानी में मेडिकल चारकोल भरपूर मात्रा में दे। अगर अधिक मात्रा में निगला हो या तकलीफ ज़्यादा देर तक रहें तो तुरन्त डॉक्टरी उपाय करें।

विषनाशक : कोई विशेष विषनाशक नही है। लक्षणों के अनुसार इलाज करें।

सावधानी : लेबल/लीफलेट में बताई गई फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें।

विक्रेता:
स्वॉल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : युपीएल लिमिटेड, रेडिमनी टैरेस, १६७,
डॉ. ॲनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई -४०० ०१८, महाराष्ट्र।

ਪਾਇਰੋਕਸੋਫ਼ਾਪ-ਪ੍ਰੋਪਾਨੀਲ ੧੫% ਡਬਲਯੂ ਪੀ
ਕਲੋਡਿਨਾਫ਼ਾਪ-ਪ੍ਰੋਪਾਰਜਿਲ ੧੫% ਡਬਲਯੂ ਪੀ

ਟੋਪਲ ਡਬਲਯੂਐਚ

(ਪੌਦੇ ਉੱਗਣ ਬਾਅਦ ਲਈ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ)

ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਉੱਗਣ ਬਾਅਦ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਣਕ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਘਾਹ ਵਰਗੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘੋਲ ਵਿਚ ੧੫੦ ਗ੍ਰਾਮ ਕਲੋਡਿਨਾਫ਼ਾਪ-ਪ੍ਰੋਪਾਰਜਿਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਮ ਹੈ (ਆਰ)-੨-[੪-[੫-ਕਲੋਰੋ)-੩-ਫ਼ਲੋਰੋ-੨-ਪਾਇਰੀਡਿਨਾਈਲ) ਆਕਸੀ] ਫ਼ੇਨੋਕਸੀ]-ਪ੍ਰੋਪਾਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋਪਾਨੀਲ ਐਸਟਰ, ਜੋ ਭਿਉਂਣ ਯੋਗ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ।

ਵਰਤੋਂ :

ਇਸਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਣਕ ਦੇ ਘਾਹ ਵਰਗੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹੈ :

ਫ਼ਸਲ	ਘਾਹ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈ ਕਿ.ਤੱਤ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈ ਨੁਸਖਾ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈ ਘੋਲ ਦਾ ਪਾਣੀ	ਅੰਤਮ ਛਿੜਕਾਅ ਤੇ ਕਟਾਈ ਵਿਚ ਉਡੀਕ ਦੇ ਦਿਨ
ਕਣਕ	ਫ਼ਲਾਰਿਸ ਮਾਈਨਰ (ਕੈਨਾਰੀ ਘਾਹ) ਗੁੱਲੀਡੰਡਾ	੬੦	੪੦੦	੩੭੫-੪੦੦	੧੧੦

ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ :

ਇਸਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ੩੦-੩੫ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਲੀਡੰਡੇ ਦੇ ੩-੪ ਪੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਘਾਹ ਵਰਗੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਤੇ ਨਮੀ ਹੋਵੇ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਗੇ ਨਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ੨ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਰੰਟ ਡਬਲਯੂਐਚ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਅਸਰ ਦਾ ਢੰਗ :

ਘਾਹ ਵਰਗੇ ਨਦੀਨ ਇਸਨੂੰ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ੪੮ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਵ੍ਰਿਧੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਵੱਧਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ੧ ਤੋਂ ੩ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਲੋਰੋਸਿਸ ਅਤੇ ਫੇਰ ਨੇਕਰੋਸਿਸ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ :

ਕਣਕ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਪਰੀਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਉਤੇ (੩ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੂਟੇ ਤਕ) ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੌਂ ਅਤੇ ਜਵੀ ਉਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ।

ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਅਸਰ:

ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਵਿਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:

ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ।

ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਢੰਗ :

ਇਸਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਨੈਪਸੈਕ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਘੱਟੋਘੱਟ ੩੭੫ ਲੀ. ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਕਟੇਅਰ ਵਰਤੋ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈਗਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰਾਂ ਵਿਚ ੫੦ ਮੈਸ਼ ਸਾਈਜ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਨੋਜ਼ਲ ਜਾਲੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਘੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

੧) ਨੈਪਸੈਕ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਲਾਉਣਾ: ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਘੋਲ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਲੈਕੇ ਬਣਾਓ, ਤਾਂਜੋ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਘੋਲ ਬਣ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਨੈਪਸੈਕ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਛਿੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਸਾ ਘੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ੧/੩ ਜਾਂ ੧/੨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਾਓ। ਘੋਲ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਰਲਾਓ ਤੇ ਫੇਰ ਨੈਪਸੈਕ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਛਿੜਕਾਓ। ਗਾੜ੍ਹਾ ਘੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ।

੨) ਨੈਪਸੈਕ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਰਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ : ਨੈਪਸੈਕ ਨੂੰ ੧/੩ ਜਾਂ ੧/੨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੋ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਪਾਓ। ਘੋਲ ਖ਼ੂਬ ਹਿਲਾਕੇ ਰਲਾਓ। ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਨੈਪਸੈਕ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।

ਭੰਡਾਰਣ :

੧) ਸਟੋਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚੰਗੇ ਰੌਸ਼ਨੀਦਾਰ, ਹਵਾਦਾਰ, ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਹੋਣ ਜੋ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦ ਹੋਣ।
੨) ਦਵਾਈ ਧੁੱਪ, ਗਿੱਲੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ, ਪਸ਼ੂ-ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਾਲਾ ਮਾਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ, ਪਸ਼ੂ-ਚਾਰਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।
੩) ਪੈਕਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੇ ਉਪਰ ਇਕ ੨ ਮੀ. ਤੋਂ ਉਂਚਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂਜੋ ਅੰਦਰ ਸਮਗ੍ਰੀ ਦੱਬੇ ਨਾ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ :

ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਾਲਾ ਮਾਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਚਮੜੀ, ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਲ, ਜਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਨਾ ਲਗਣ ਦਿਓ। ਹਵਾੜ ਜਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਧੁੰਦ ਵਿਚ ਸਾਹ ਨਾ ਲਓ। ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ, ਧੁਮਰਪਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ-ਮੂੰਹ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਤਬੀਅਤ ਖ਼ਰਾਬ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਰੋਕਕੇ ਫ਼ੌਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਵਹਿਣ ਦੇ ਰੁਖ ਹੀ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ੁਆਰ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਬਾਰਬਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਹੇ। ਘੋਲ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੋ, ਯਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤਾਨੇ, ਲਬਾਦਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ/ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ। ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਬਾਦਾ, ਹੈਟ ਜਾਂ ਟੋਪ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਬੂਟ। ਜੇ ਗਾੜ੍ਹਾ ਘੋਲ ਜਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਲਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਚਮੜੀ ਖ਼ੂਬ ਧੋਵੋ, ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤਕ ਮਾਰੋ, ਪਲੀਤ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰੋ। ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਖ਼ੂਬ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਕਪੜੇ ਬਦਲੋ। ਪਲੀਤ ਕਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਨੋ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਸਾਮੱਗ੍ਰੀ ਨਦੀ-ਨਾਲੇ, ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਚਾਰਾ ਜਾਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰੋ।

ਖ਼ਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ : ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਬਚੀ ਦਵਾਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਓ ਜੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ੁਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਖ਼ਾਲੀ ਡੱਬੇ ਐਸੀ ਥਾਂ ਦਬਾਓ ਜੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਖ਼ਾਲੀ ਡੱਬੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੋ।

ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਲੱਛਣ : ਡਾਈਸਪ੍ਰੀਆ, ਥੁੱਕਾਂ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਲਨ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਫ਼ੌਰੀ ਇਲਾਜ : ਜੇ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਔਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਖੁਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖ਼ੂਬ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਸਾਹ ਵਿਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲਓ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਪੇਟ ਵਿਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਲਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ।

ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ : ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ ਨਹੀਂ। ਲੱਛਣਾਂ ਅਨਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਚਿਤਾਵਨੀ: ਇਸ ਲੇਬਲ/ ਪਰਚੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵਰਤੋ।

ਵਿਪਣਕ :
ਸਵਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿ.
ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਦਫ਼ਤਰ : ਯੂਪੀਐਲ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਰੈਡੀਮਨੀ ਟੈਰੇਸ, ੧੬੭,
ਡਾ. ਏ. ਬੀ. ਰੋਡ, ਵਰਲੀ, ਮੁੰਬਈ-੪੦੦ ੦੧੮, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ।