

ਵੈਨਡੈਕਸ

ਵੈਲੀਡੋਮੀਸਿਨ 3% ਐਲ ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ ਪ੍ਰਤਿਜੈਵਿਕ

ਵੈਲੀਡੋਮੀਸਿਨ 3% ਐਲ ਇੱਕ ਐਂਟੀਫੰਗਲ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਜੈਵਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਬਣਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਤਿਜੈਵਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਬ ਬਲਾਇਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਿਜੈਵਿਕ ਹੈ।

ਤੱਤ	% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਵੈਲੀਡੋਮੀਸਿਨ ਦੇ ਆਈ	3.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਪੋਲੀਅੱਕਸੀ ਇਥਾਈਲੀਨ ਨੋਨਾਇਲ ਫਿਨਾਇਲ ਈਥਰ (ਐਨਪੀ-85)	2.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਸਿਲਿਕੌਨ-ਕੋਐਮ-72	0.01% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਪੋਟਾਸ਼ਿਅਮ ਸੋਰਬੇਟ	0.05% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਐਸਿਡ ਗ੍ਰੀਨ ਡਾਈ	0.01% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਪਾਣੀ	ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ %
ਕੁਲ:	100.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ

ਫ਼ਸਲਾਂ	ਪ੍ਰਤਿਜੈਵਿਕ ਦਾ ਸਧਾਰਣ ਨਾਂਅ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕ	ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ (ਲੀਟਰ)	ਅੰਤਮ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)
ਏ.ਆਈ. (ਗ੍ਰਾ੍)	ਵਾਰਮੁਲੇਸ਼ਨ (ਮਿ.ਲਿ.)			
ਝੋਨਾ	ਸੀਬ ਬਲਾਇਟ	60	2000	750

ਪ੍ਰਤਿਜੈਵਿਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ:
ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼:
ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰਮੁਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰੋ।
ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:
ਬਾਰਿਸ਼, ਹਵਾ ਅਤੇ ਗਰਮ ਸੂੱਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਪ੍ਰੇ ਨਾ ਕਰੋ।
ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ:
ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਜੈਵਿਕ ਸਪ੍ਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਖੋਰੀ ਕੋਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਅਵਸਥਾ:
ਲੋੜ ਅਧਾਰਤ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ 'ਤੇ (45–75 ਡਿਗ਼ੀਈ)।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕ, ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਨੋਂਜਲ ਦੀ ਕਿਸਮ:
ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੌਪਸ਼ੇਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਫੁੱਟ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੌਪਸ਼ੇਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੌਪਸ਼ੇਕ ਬੈਟਰੀ, ਅਤੇ ਵਲੰਟ ਫੈਨ ਜਾਂ ਫਲੱਡ ਜੈਟ ਨੋਜ਼ਲ ਨਾਲ ਫਿਟ ਕੀਤੇ ਏਐਸਪੀਈਈ-ਐਚਟੀਪੀ ਪਾਵਰ ਸਪ੍ਰੇਅਰਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਤਰਾ:
ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤਾਲਿਕਾ ਅਨੁਸਾਰ।

ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼:
1. ਪ੍ਰਤਿਜੈਵਿਕ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਾਪੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਕੀ ਬਰੀ ਹੋਈ ਮਾਤਰਾ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਾਓ।
2. ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੈਨਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਮੁੜ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ:
24 ਘੰਟੇ।
ਵਾਈਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ (ਪੀਐੱਚਆਈ):
ਦਾਇਆਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਵਾਈਓ ਦੇ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ:
ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਮਾਂ ਇਹਦਿਆਤ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ।
ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ:
ਸਵੇਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਾਰਵਾਚਤਾ ਵੱਧੋਂ ਵਧ ਤਿਤਕਾਅ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ:
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛਿੜਕਾਅ।
ਉਹ ਪੜਾਅ ਜਿਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਜੈਵਿਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ:
ਤਨੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲੇਬਲ ਪਰਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮਧੁਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੀਵਾਂ ਵਰਗੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:
ਮਧੁਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲੀਨੇਟਰਸ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਜਾਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।

ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ:
ਸਿਰ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁਢਲੀ ਡਾੱਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ:
1. ਨਿਗਰਾਣ ਤੇ:
ਬਿਨਾ ਡਾੱਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਗੀ ਨੂੰ ਭੁੱਝ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਵੋ, ਜੇਕਰ ਰੋਗੀ ਸੁਰੋਤ ਅਤੇ ਚੌਕੰਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 1–2 ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ। ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
2. ਸੁੰਘਣਾ:
ਸੁੰਘਣ ਤੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਸਨੂੰ ਗਰਮ ਅਤੇ ਸਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਨਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰ ਆੱਕਸੀਜਨ ਦਿਓ। ਤੁਰੰਤ ਡਾੱਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਓ।
3. ਤੂੜਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ:
ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਵੋ। ਦਰਦ, ਲਾਲੀ, ਜਾਂ ਜਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾੱਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਸਾਰੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
4. ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ:
ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਧੋਵੋ। ਜੇਕਰ ਦਰਦ, ਜਲਨ ਜਾਂ ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਫੋਟੋਫੋਬੀਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾੱਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ।

ਜ਼ਹਿਰਨਾਸ਼ਕ:
ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਹਿਰਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:
ਛਿੜਕਾਅ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨੋ। ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਵੋ। ਸਪ੍ਰੇ ਦੇ ਬੂੰਦੋਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਵੋ। ਛਿੜਕਾਅ ਦੌਰਾਨ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਾ ਕਰੋ।

ਡੰਡਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ:
1. ਪ੍ਰਤਿਜੈਵਿਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਗਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਲਗ ਕਾਰੋ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਗ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਜੈਵਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ।
2. ਪ੍ਰਤਿਜੈਵਿਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁੱਕੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਭਾਡ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੱਬਿਆਂ, ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਧੋਂਦਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ:
1. ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਜੈਵਿਕ ਨਿਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦਾ ਫ਼ਰਕਾਹੋ ਕਿ ਡੱਬਿਆਂ/ਪੈਕੇਜ਼ ਜਾਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤਿਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਸਾਮਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਏ।
2. ਉਪਯੋਗ ਕਿਤੇ ਗਏ ਝੋਝੇ/ਪੇਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛਡੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਪੇਪਟਾ/ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮੋੜ ਕੇ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਥ ਦਿਓ।
4. **ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।**

ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:
1. ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਕੀਟਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਪੁਰਜੀ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ।
3. ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮਧੁਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ।

ਵੇਨਡੇਕਸ

ਵਾਲੀਡਾਮਾਇੰਸਿਨ 3% ਸਾਂਡ ਅੰਤਰੱਪ੍ਰਵਾਹੀ ਪ੍ਰਤਿਜੈਵਿਕ

ਵਾਲੀਡਾਮਾਇੰਸਿਨ 3% ਸਾਂਡ਼ ਏਕ ਫਯੂਂਦਨਾਸ਼ਾਕ ਤਥਾ ਪ੍ਰਤਿਜੈਵਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰਨਧਾਰਿਯੋਂ ਕੇ ਲਿਯੇ ਝੁਸਕੀ ਵਿਥਾਜ਼ਾ ਨਿਸ਼ਮ ਸ਼੍ਰਨਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤ: ਯਹ ਏਕ ਸੁਰਕ਼਼ਿਤ ਪ੍ਰਤਿਜੈਵਿਕ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਧਾਨ ਪਰ ਆਛਰਦ ਅਂਗਮਾਰੀ ਰੋਗ ਕੇ ਨਿਧੰਤ੍ਰਗ ਕੇ ਲਿਯੇ ਪ੍ਰਸਾਵਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤਿਜੈਵਿਕ ਹੈ।

ਤਰ੍ਹਕ	% ਮਾਰ /ਮਾਰ
ਵਾਲੀਡਾਮਾਇੰਸਿਨ ਸਕ੍ਰਿਯ ਤਰ੍ਹਕ	3.00% ਮਾਰ / ਮਾਰ
ਪੋਲੀਅੱਕਸੀ ਝੁਥਾਝੀਲੀਨ ਨੋਨਾਝਲ ਫਿਨਾਝੀਲ ਝੰਧਾਰ (ਏਨ. ਪੀ. 85)	2.00% ਮਾਰ / ਮਾਰ
ਸਿਲਿਕੋਨ—ਕੇ.ਏਸ.—72	0.01% ਮਾਰ / ਮਾਰ
ਪੋਟਾਸ਼ਿਯਮ ਸੋਰਕਬੇਟ	0.05% ਮਾਰ / ਮਾਰ
ਏਸਿਡ ਹੁਈ ਡਾਝੀ ਪਾਨੀ	0.01% ਮਾਰ / ਮਾਰ
ਧਰਯਾਂਤ ਮਾਤ੍ਰਾ %	
ਯੋਗ :	100.00% ਮਾਰ / ਮਾਰ

ਫਸਲੇਂ	ਪ੍ਰਤਿਜੈਵਿਕ ਕਾ ਸਾਮਾਨ੍ਯ ਨਾਮ	ਪ੍ਰਤਿ ਹੈਕਟੇਯਰ ਮਾਤ੍ਰਾ ਸ.ਤਰ੍ਹਕ (ਗ੍ਰਾਮ)	ਸੰਰਚਨਾ (ਮਿ.ਲੀ)	ਪਾਨੀ ਕੀ ਮਾਤ੍ਰਾ (ਲੀਟਰ)	ਅਜ਼ਿਸ਼ ਖਿੜਿਕਾਵ ਤਥਾ ਫਸਲ ਕਾਟਨੇ ਕੇ ਬੀਚ ਅਜ਼ਰਾਲ (ਦਿਨ ਮੇਂ)
ਧਾਨ	ਆਛਰਦ ਅਂਗਮਾਰੀ	60	2000	750	ਫਸਲ ਕਟਾਝੀ ਕੇ 14 ਦਿਨੋਂ ਕੇ ਪਹਲੇ ਧਾਨ ਕੇ ਧਾਨੀਂ ਵ ਮੂਰ੍ਹੀ ਪਰ ਫਯੂਂਦੀਨਾਸ਼ਕ ਕਾ ਅਂਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਨਾ ਚਾਹਿਯੇ।

ਪ੍ਰਤਿਜੈਵਿਕ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋ ਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਛਝੇ ਅਸ੍ਯਾਸ

ਤਪਯੋਗ ਕੇ ਲਿਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰ್ದੇਸ਼ : ਅਨੁਸ਼ਾਂਸਿਤ ਖੁਰਾਕ ਕਾ ਤਪਯੋਗ ਕਰੋਂ। ਪਾਨੀ ਕੀ ਆਵਸ਼ਯਕ ਮਾਤ੍ਰਾ ਮੇਂ ਸੂਤ੍ਰੀਕਰਯ ਕੀ ਪਤਲਾ ਕਰੋਂ।
ਸੀੁਸਮ ਕੀ ਸ਼ਿਥਤਿ : ਕਾਰਿਸ਼, ਹਵਾ ਔਰ ਗੰਮ ਥੂਪ ਕੀ ਅਵਧਿ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਚੁੇ ਨ ਕਰੋਂ।
ਮਿਟ੍ਰੀ ਔਰ ਪਾਨੀ : ਯਹ ਪ੍ਰਤਿਜੈਵਿਕ ਪਯਾਂ ਆਵੇਦਨ ਕੇ ਲਿਏ ਹੈ ਔਰ ਅਨੁਸ਼ਾਂਸਿਤ ਖੁਰਾਕ ਪਰ ਤਪਯੋਗ ਕ੍ਰਿਏ ਜਾਨੇ ਪਰ ਝੁਸਕਾ ਕੀਝੀ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਪ੍ਰਸਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਲੀਯ ਕ੍ਰੂਥਿ ਕੇ ਪਾਸ ਤਪਯੋਗ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਥੇਂ। ਆਵੇਦਨ ਕੇ ਲਿਏ ਫਸਲ ਅਵਰਥਾ: ਪਹਲੇ ਲਖਯਾਂ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਰੋਗ ਕੀ ਤਪਸ਼ਿਥਤਿ (45—75 ਝੀਏਟੀ) ਕੀ ਆਵਸ਼ਯਕਤਾ ਹੋਤੀ ਹੈ।

ਆਵੇਦਨ ਤਕਨੀਕ, ਤਪਕਰਯ ਪ੍ਰਕਾਰ ਔਰ ਨੀੂਜਲ ਪ੍ਰਕਾਰ : ਨੈਪਸੇਕ ਸ਼੍ਰੇਯਰ, ਫੂਟ ਸ਼੍ਰੇਯਰ, ਕਮ੍ਧੇਸ਼ਨ ਨੈਪਸੇਕ ਸ਼੍ਰੇਯਰ, ਕਮ੍ਧੇਸ਼ਨ ਨੈਪਸੇਕ ਬੈਟਰੀ ਸ਼੍ਰੇਯਰ, ਪਲੇਟ ਕੌਲ੍ਯੂਸ ਯਾ ਪਲਡ ਜੇਟ ਨੀੂਜਲ ਕੇ ਸਾਥ ਫਿਟ ਕ੍ਰਿਏ ਗਏ ਔਰ ਏਸਪੀਝੀਝੀ—ਏਚਟੀਪੀ ਪਾਵਰ ਸ਼੍ਰੇਯਰ ਕਾ ਤਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਯਹ ਤਪਾਦ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗ ਕ੍ਰਿਯਾ ਜਾਤਾ ਹੈ।

ਮਾਤ੍ਰਾ : ਅਨੁਸ਼ਾਂਸਿਤ ਫਸਲੀਂ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਤਾਲਿਕਾ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ।

ਮਿਸ਼੍ਰਾਯ ਕੇ ਲਿਏ ਨਿਰ್ದੇਸ਼:
1. ਤਪਾਦ ਕੀ ਆਵਸ਼ਯਕ ਮਾਤ੍ਰਾ ਕੀ ਮਾਪੋਂ ਔਰ ਝੁਸੇ ਥੀਝੀ ਮਾਤ੍ਰਾ ਮੇਂ ਪਾਨੀ ਕੇ ਸਾਥ ਅਛਝੀ ਤਰਹ ਮਿਲਾਓ। ਪਾਨੀ ਕੀ ਸ਼ੇਥ ਮਾਤ੍ਰਾ ਕੀ ਆਂਦੋਲਨ ਕੇ ਸਾਧ੍ਯਮ ਕੇ ਪਾਨੀ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਨਿਰ್ದਿੱਧ ਕਰੋਂ।
2. ਸ਼੍ਰੇਯਰ ਮੇਂ ਸੀਥੇ ਨਿਸ਼ਕ ਕਰੋਂ ਔਰ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਥ ਪ੍ਰਦਰੱਸ਼ਨ ਔਰ ਪਰਯੰਕਰਯ ਸੁਖਸ਼ਾ ਕੇ ਲਿਏ ਅਥੰਡਤਾ ਰਖਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਤੁਰੰਤ ਆਵੇਦਨ ਕਰੋਂ।

ਪੂਨ: ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀ ਅਵਧਿ :
24 ਬੰਟੇ।
ਪੂਰ੍ਵ ਫਸਲ ਕਾ ਅੰਤਰਾਲ: ਫਸਲ ਕਟਾਝੀ ਕੇ 14 ਦਿਨੋਂ ਕੇ ਪਹਲੇ ਧਾਨ ਕੇ ਧਾਨੀਂ ਵ ਮੂਰ੍ਹੀ ਪਰ ਫਯੂਂਦੀ ਨਾਸ਼ਾਕ ਕਾ ਅਂਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਨਾ ਚਾਹਿਯੇ।
ਆਵੇਦਨ ਕਾ ਸਮਯ ਔਰ ਸਮਯ: ਨਿਵਾਰਕ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਯਾ ਰੋਗ ਕੇ ਲਖਯਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰਾਸੰਧਿਕ ਚਰਯ ਮੇਂ ਸਰਬੱਤਸ਼ ਸਮਯ।
ਆਵੇਦਨ ਕਾ ਸਮਯ: ਸੁਬਹ ਯਾ ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਸਮਯ ਝੁਸ਼ੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬੇਹਤਰ ਹੋਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕ ਕੇ ਅਧਿਕ ਅਂਕ ਸਹਿਤ ਆਵ੍ਰਿਥਿ: ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਏਕ ਸ਼ੇ।
ਚਰਯ ਜਿਸਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੀ ਥੀ ਫਸਲ ਪਰ ਪ੍ਰਤਿਜੈਵਿਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਯਾ ਜਾਨਾ ਚਾਹਿਏ: ਤਨੇ ਕੇ ਭਢਨੇ ਸੇ ਪਹਲੇ ਤਥਾ ਪ੍ਰੂਖਯਗ ਕੇ ਭਾਦ ਝੁਸਕਾ ਝੁਸ਼ੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਯਾ ਜਾਨਾ ਚਾਹਿਏ।
ਲੇਕਲ ਔਰ ਪਰ੍ਥੀ ਪਰ ਤਲਿਲ੍ਖਿਤ ਨ ਹੋਨੇ ਕੀ ਸ਼ਿਥਤਿ ਮੇਂ, ਝੁਸਕਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਫਸਲ ਪਰ ਨ ਕਰੋਂ।
ਜਲਿਯ ਜੀਵੀਂ ਕੇ ਲਿਏ ਵਿਥਾਜ਼ ਹੈ ਝੁਸਲਿਏ ਝੁਸਕਾ ਤਪਯੋਗ ਜਲ ਨਿਕਾਯੀਂ ਯਾ ਮਝਲੀ ਪਾਲਨ ਖੇਤ੍ਰ ਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਏ।
ਸ਼ਾਹਦ ਕੀ ਸੁਕ੍ਰਿਥਯੀਂ ਔਰ ਕੀਟੀਂ ਕੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰੁਤਿਕ ਸ਼ਾਤ੍ਰੁਯੀਂ ਜੈਸੇ ਲਾਮਕਾਰੀ ਕੀਝੀਂ ਕੇ ਨੂਕਸਾਨ ਸੇ ਬਚਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਕਰਟੀ ਜਾਨੇ ਕਾਲੀ ਸਾਵਧਾਨਿਯੀਂ:
ਮਧੁਸੁਕ੍ਰਿਥਯੀਂ ਔਰ ਅਨ੍ਧ ਪਰਾਗਯਗਕੋਂ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਟਿਨ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਫੀਰੇਜ਼ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਮਹਤ੍ਵਪੂਰ੍ਣ ਰੂਪ ਸੇ ਸੁਬਹ ਯਾ ਏਰ ਸ਼ਾਮ ਕੀ ਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਗਲਤੀ ਕੇ ਥੀ ਚਨ੍ਹੇਂ ਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਕਾ ਯੀਯ੍ਰਿਸ਼ ਕਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ।

ਵਿਥ ਕੇ ਲਖਯਾ: ਸਿਰਦਰੱ, ਚਕਕਰ ਆਨਾ, ਸਿਰਲੀ, ਤਲਟੀ, ਬਖਰਾਹਟ ਹੋ ਸਕਯੇਂ ਹੈਂ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਚਿਕਿ੍ਤਸਾ:
1. ਨਿਯਲ ਜਾਨੇ ਪਰ : ਯਦਿ ਯਕ੍ਰਿਿ ਹੋਸ਼ ਮੇਂ ਔਰ ਸਤਰੱ ਹੈ, ਤੋ ਪਾਨੀ ਕੇ ਸਾਥ ਮੁੱਢ ਕੀ ਕੂਲ੍ਰਾ ਕਰੋਂ ਔਰ ਚੁਸੇ 1 ਯਾ 2 ਗਿਲਾਸ ਪਾਨੀ ਪਿਲਾਓ।
ਬੇਹੋਸ਼ ਯਕ੍ਰਿਿ ਕੀ ਮੁੱਢ ਸੇ ਕੁਝ ਮੀ ਨ ਏ।
ਡਾੱਕਟਰ ਕੀ ਬੁਲਾਓ।
ਜਬ ਤਕ ਚਿਕਿ੍ਤਸਕ ਫ਼ਯਾਰਾ ਕਫ਼ਾ ਨ ਜਾਏ ਤਲਟੀ ਨ ਕਰਵਾਓ।
2. ਸਾਂਸ ਮੇਂ ਜਾਨੇ ਸੇ : ਸਰੀ੍ਯ ਕੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਮੇਂ ਲਾਏ ਔਰ ਸ਼ਰੀਰ ਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾ ਘ੍ਯਾਲ ਰਖਿਏ।
ਸਰੀ੍ਯ ਸਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੇ ਪਾ ਰਫ਼ਾ ਹੈ ਯਾ ਸਾਂਸ ਲੇਨੇ ਮੇਂ ਕਠਿਨਾਝੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਚੁਸੇਂ ਮੁੱਢ ਕੇ ਫ਼ਯਾਰਾ ਕੂਤ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਵਸਨ ਏ।
ਚਿਕਿ੍ਤਸਕ ਸੇ ਪਰਾਮਸ਼ ਕਰੋਂ।
3. ਤ੍ਰਵਾ ਕੇ ਸੰਪਰੱ ਸੇ : ਅਛਝੀ ਤਰਹ ਸੇ ਸਾਬੁਨ ਕੇ ਸਾਥ ਝ੍ਯਾਦਾ ਪਾਨੀ ਸੇ ਕਾਲ ਔਰ ਨਾਖ੍ਰੁਤੀਂ ਕੇ ਨਿਚੇ ਸਹਿਤ ਸ਼ਰੀਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ ਹਿਸ੍ਰਸੇ ਕੀ ਥੀ ਧੋ ਲੋ।
ਦਰੱ, ਲਾਲੀ ਯਾ ਜਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਤੀ ਹੈ ਤੋ ਡਾੱਕਟਰ ਸੇ ਪਰਾਮਸ਼ ਕਰੋਂ।
ਸਮੀ ਟ੍ਰੂਸ਼ਿਤ ਕਪਡੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਔਰ ਅਛਝੀ ਤਰਹ ਸੇ ਅਲਗ ਸੇ ਤਪਯੋਗ ਕਰਨੇ ਸੇ ਪਹਲੇ ਸਾਬੁਨ ਔਰ ਪਾਨੀ ਸੇ ਧੀਏ ਜਾਨੇ ਚਾਹਿਏ।
4. ਔੱਖ ਕੇ ਸੰਪਰੱ ਸੇ : ਔੱਖੇ ਝ੍ਯਾਦਾ ਪਾਨੀ ਸੇ ਹਲਕੇਂ ਸੇ ਕਸ ਸੇ ਕਸ 15 ਮਿਨਿਟ ਤਕ ਥੀਏ।
ਅਗਰ ਦਰੱ, ਜਲਨ, ਲਾਲੀ ਯਾ ਫ਼ੋਟੀਫੋਬਿਯਾ ਜਾਰੀ ਰਹਤਾ ਹੈ ਤੋ ਨੇਤ੍ਰ ਵਿਸ਼ੇਥਝ਼ ਸੇ ਪਰਾਮਸ਼ ਕਰੋਂ।

ਵਿਥਾਨਾਸ਼ਾਕ: ਕੀਝੀਂ ਵਿਥਿਧਿ ਵਿਥਾਨਾਸ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਖਯਾਨੁਸਾਰ ਝੀਲਾਜ ਕਰੋਂ।

ਪ੍ਰਯੋਗਕਰ੍ਤਾਔੀਂ ਕੇ ਲਿਯੇ ਸਾਵਧਾਨਿਯੀਂ: ਖਿੜਿਕਾਵ ਕਾ ਮਿਸ਼੍ਰਾਯ ਕਰ੍ਯਤੇ ਸਮਯ ਔਰ ਖਿੜਿਕਾਵ ਕਰ੍ਯਤੇ ਸਮਯ ਸ਼ਰੀਰ ਪਰ ਪੂਰ੍ਵ ਢਕਨੇ ਕਾਲੇ ਵਸ੍ਤ੍ਰ ਪਧਨ ਲੋਂ। ਖਿੜਿਕਾਵ ਕੇ ਭਾਦ ਗੰਏ ਕਪਡੀ ਔਰ ਸ਼ਰੀਰ ਕੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹਿਸ੍ਰਸੀਂ ਕੀ ਅਛਝੀ ਤਰਹ ਪਾਨੀ ਸੇ ਧੀ ਲੋਂ।
ਸ਼੍ਰੇ ਕੇ ਥੂਏਂ ਕੀ ਸ਼ਵਾਸ ਮੇਂ ਨ ਲੋਂ। ਖਿੜਿਕਾਵ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਧੂਸ਼ਪਾਨ ਨ ਕਰੋਂ, ਕੂਝ ਨ ਪਿਏਂ, ਘ੍ਰਾਏਂ ਯਾ ਬਰਾਏਂ।

ਸੰਪ੍ਰਫ਼ਰਯ ਕੀ ਸ਼ਰੱੋਂ : ਪ੍ਰਤਿਜੈਵਿਕ ਰਖੇਂ ਹੁਯ ਡਿਙਕੀਂ / ਪੈਕੇਜ਼ਸ ਕੀ ਅਲਗ ਕਸਰੀਂ ਯਾ ਜਗਠੀਂ ਮੇਂ ਤਨ ਕਸਰੀਂ ਯਾ ਜਗਠੀਂ ਜਿਨਮੇਂ ਅਨ੍ਧ ਕਸ੍ਤ੍ਰੁਯੋਂ ਰਖੀਂ ਜਾਤੀ ਹੈਂ, ਤਨਸੇ ਦੂਰ ਰਖਨਾ ਚਾਹਿਏ ਯਾ ਅਲਗ ਅਲਮਾਰਿਯੋ ਮੇਂ ਤਾਲਾਕਾਬੀ ਲਗਾਕ੍ਰ ਪ੍ਰਤਿਜੈਵਿਕ ਕੀ ਪ੍ਰਸਾਯ ਵ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਰਖੇਂ।
2. ਜਿਸ ਕਸਰੇ ਯਾ ਅਲਮਾਰੀ ਮੇਂ ਪ੍ਰਤਿਜੈਵਿਕ ਕਾ ਮੰਡਾਰਯਗ ਕਰਨਾ ਹੋ ਵਹ ਅਛਝੀ ਤਰਹ ਬਨਾ ਹੁਯਾ, ਸੂਰ੍ਖਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਯ, ਹਵਾਦਾਰ ਤਥਾ ਪਰਯਾਂਤ ਆਕਾਰ ਕਾ ਹੋਨਾ ਚਾਹਿਏ ਜਿਸਸੇ ਪ੍ਰਤਿਜੈਵਿਕ ਕੇ ਮਾਪ ਸੇ ਕਾਤਾਵਰਯ ਪ੍ਰਫੂਸ਼ਿਤ ਹੋਨੇ ਕਾ ਖਤਰਾ ਨ ਰਫ਼ੇ।

ਪ੍ਰਤਿਜੈਵਿਕ ਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕ੍ਰਿਏ ਗਏ ਡਿਙਕੀਂ, ਕਥੇ ਹੁਏ ਪ੍ਰਤਿਜੈਵਿਕੀਂ ਤਥਾ ਡਿਙਕੀਂ ਕੇ ਧੀਵਨ ਕਾ ਨਿਪਟਾਰਾ:
ਯਹ ਪ੍ਰਤਿਜੈਵਿਕ ਨਿਸ਼ਾਂਤਾ ਤਥਾ ਤਪਯੋਗਕਰ੍ਤਾ ਕਾ ਕਰ੍ਤ੍ਵਯ ਹੈ ਕਿ ਵਹ ਡਿਙਕੀਂ / ਪੈਕੇਜ਼ਸ, ਕਥੇ ਹੁਏ ਪ੍ਰਤਿਜੈਵਿਕ ਤਥਾ ਸਾਧਨੀਂ ਕੇ ਧੀਵਨ ਕਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਰਕ਼਼ਿਤ ਢੰਗ ਸੇ ਕਰੇ ਜਿਸਸੇ ਕਾਤਾਵਰਯ ਯਾ ਪਾਨੀ ਪ੍ਰਫੂਸ਼ਿਤ ਨ ਹੋ।
2. ਤਪਯੋਗ ਕ੍ਰਿਏ ਗਏ ਡਿਙਕੀਂ / ਪੈਕੇਜ਼ਸ ਕੀ ਕਾਹਰ ਨ ਫੰਕੇ ਜਿਸਸੇ ਤਨਕਾ ਟੁਕਾਰਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨ ਹੋ।
3. ਤਪਯੋਗ ਕ੍ਰਿਏ ਗਏ ਡਿਙਕੀਂ / ਪੈਕੇਜ਼ਸ ਕੀ ਟੀਡਕਰ ਆਕਾਢੀ ਸੇ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਂ ਗਾਡ਼ ਏਂ।
4. ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰ ਕਾ ਝੁਸ਼ੁੰਟੇਮਾਲ ਖ਼ਰਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਸੁਰੁਸ਼ਾ ਕੇ ਲਿਏ ਸਾਵਧਾਨਿਯੀਂ :
1. ਲੇਕਲ ਔਰ ਪਰ੍ਥੀ ਪਰ ਯੀ ਅਸਿਦ੍ਰਵਤ ਹੈ, ਚਰਸੇ ਸਿਨ੍ਨਾ ਅਨ੍ਧ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਮੇਂ ਤਪਯੋਗ ਕੇ ਲਿਏ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2. ਲੀਫਲੇਟ ਕੇ ਨਿਰ್ದੇਸ਼ਾਨੁਸਾਰ ਤਪਯੋਗ ਕੇ ਪਸ਼ਕਾਤ ਡਿਙਕੀਂ ਕੀ ਨਢ ਕਰੋਂ।
3. ਜਲ ਨਿਕਾਯੀਂ ਕੇ ਸਾਥ ਝੁਸਕਾ ਮਿਸ਼੍ਰਾਯ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਥੇਂ, ਕ੍ਰੁੱਕਿ ਮਾਸ਼ਲੀ ਔਰ ਮਧੁਸੁਕ੍ਰਿਥਯੀਂ ਕੇ ਲਿਏ ਵਿਥਾਜ਼ਤ ਹੈ।

VANDEXValidamycin 3% L Systemic Antibiotic

Validamycin 3% L is an antifungal preparation and antibiotic compound. It has low mammalian toxicity and hence a safe antibiotic. It is an effective antibiotic for the control of rice sheath blightonly.

Components Name	% w/w
Validamycin A. I.	3.00% w/w
Polyoxy ethylene nonyl phenyl ether (NP-85)	2.00% w/w
Silicone-KM-72	0.01% w/w
Potassium sorbate	0.05% w/w
Acid green dye	0.01% w/w
Water	Q. S %
Total	100.00% w/w

Crop(s)	Common Name of Antibiotic	Dosage / HA A.I. Formulation (gm) (ml)	Dilution in water (Ltr.)	Waiting Period from last spray to harvest (In Days)
Rice	Sheath Blight	60	2000	750

Good Practices relating to Antibiotic application techniques

Direction for use:- Use recommended dose. Dilute the formulation in required quantity of water.
Weather conditions: Do not spray during rainy, windy and hot sunny period.
Soil and water: This Antibiotic is for foliar application and has no adverse effect when used at recommended dose. Avoid using near aquaculture.
Crop stage for application: Need based at the first symptoms of disease appearance (45-75 DAT).

Application technique, equipment type & Nozzle type: This product application using Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery and ASPEE-HTP power sprayer fitted with flat fan or flood jet nozzle.

Dosage: As per above recommended crops dosage table.

Instruction for mixing: 1. Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified of water through agitation.
2. Mix directly into sprayer and apply immediately to keep integrity for best performance and environmental safety.

Re-entry Period: 24 hours.
Pre-Harvest Interval (PHI) : There should be no residues on grains and straw of paddy 14 days before the harvest.
Manner and Time of Application: Best time as preventive or at early stage of disease symptoms.
Application timings: Should be applied preferably in the morning and evening.
Frequency including maximum number of sprays: Generally one spray.
Stages during which Antibiotic should not be applied on any crop: Should not be used before stem elongation and after flowering. Not to be used on crop other than mentioned on this label/leaflet. Toxic to aquatic organisms hence should not be used near water bodies or pisciculture area.
Precaution to be taken to avoid harm to the beneficial insects like honey bees and natural enemies of pests: As bees and other pollinators forage during the day, important is to spray in early morning or late evening to reduce the risk of accidentally spraying them even.

Symptoms of Poisoning: Headache, giddiness, nausea, vomiting and anxiety may occur.

First Aid :
1. If ingestion: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2

