285mm.

210mm.

ರ್ಯಾಟ್ ಫ್ರೀ
ಮೂಷಕನಾಶಕ

ಜಿಂಕ್ ಫಾಸ್ಫೈಡ್

ಉಪಯೋಗಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು : ರೆಟೊಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕವಾಗಿ ಜಿಂಕ್ ಫಾಸ್ಫೈಡ್ ಇದೆ. ಇಧು ಮನೆ ಗೋದಾಮು, ಹೊಲ, ಹಣ್ಣುಗಳ ತೋಟ ಮತ್ತು ಹೂದಾರಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಮನ ಇಲಿ, ಹೆಗ್ಗಣ ಮದೊಲಾದ ದಂಶಕವರ್ಗದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಲಲೋಭನಗೆಗಳಿಸಲು, ಉಪಯೋಗಿಸಲಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮಾಣ :

ಉಪಯೋಗಿಸಲು ನಿಯಮಗಳು	ಜೀವ-ದಂತು ಅಗಾರನಿಸಂಸ	ಸಮುದಾಯ ಸ.ಘಟಕ	ಪ್ರಲೋಭನ ಪ್ರಮಾಣ ಚಿತ್ರಿಳಲ್
1.ಹೊಲದ ದಂಶಕ ಪ್ರಾಣಗಳ ಹತೋಟಗಾಗಿ	ರೆಟ್ಟಾಲ್ ಸೆಟ್ಟಾಲ್ ಆರ್.ಮೆಟ್ಟಿ	1.5ರಿಂದ 2.5%	1.875 3.125
2. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂಬೇಕಿ ಪಡದ ತಣ್ಣುರ ಮೇಲ್ಲಿ ಬಾರಯಯಎಂಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು	ಬೇಂಡಿಕೋಟಾ ಬೇಂಗರಲ್ಸ್ ಟಟೆಣಾ ಇಂಡಿಕಾ ಮಸ್ ಬೂಂಡಗಾ ಮಸ್ ಪ್ಲಾಟಿಥ್ರಿಗ್ ಮಂಟೊಸಸ್ ಪಂಯೋಕೇ ರೆಟ್ಟಾ ನಾರ್ಪರ್ಬೆಕ್ಸ್ ಕಾಯೆರುಲಸ್ಸ್		

ಪ್ರಯುವಷಗಿಸಲು ಪಾಗದ ಆಯ್ಕೆ : ಸಾಭ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಿತ್ರಣ ವಾರ, ನೀರು ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರಯಸ್ಸಾಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗಣ ಮಾದಲಾಡುವುಗಳಿಗೆ ಸಲಣವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಣ ಹಾಗೂ ಆಪ್ಪಾ ರಹಿತ ಜಾಗಗಲಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಿಲಗಳ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮರಯಲ್ಲಿ ರವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲ ಮತ್ತು ಗೋಡಗಳ ಸಡುವ ಇಲಿ ಹಾಗೂ ಹೆಗ್ಗಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡಬರುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳು ಇರುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಂಡುಬರುಜಲಿಲ ಇರುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಲೋಭಣೆಗೆ ಮೊದಲು : ಪ್ರಲೋಭನೆಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು 5-10 ಗ್ರಾಮ್ (1-2 ಚಾ ಚಮಚೆ) ರೇಟಾಲ್‌ನ್ನು ಸೇರಿಸದ ಖಾದ್ಯಪದಾರ್ಥ ಧನ್ಯ, ಕಡಲೆ ಬ್ಲೆಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ವನ್ನು ಪ್ರಲೋಭನಗೊಳಿಸಲಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಮೊದಲೇ . ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೇಟ್‌ಫ್ರಿ ಸೇರಿಸಿದ ಖಾದ್ಯಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಆಲೆಗಬೀಗ ಫೈರ್ಯ ಬರುವುದು.

ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆಗ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಹಟ್ಟನ್ನ ಖಾದ್ಯಪತಾರ್ಥ ಎಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಆಪಾಗದಲ್ಲಿ 5-10 ಗ್ರಾಮ್ ರೇಟ್‌ಫ್ರಿ ಪಾರ್ದಾರ್ಥ ಇಡಿರಿ(ರೇಟ್‌ಫ್ರಿ ಸೇರಿಸದ ಪಾದ್ಯಪಾದಾರ್ಥ ತಿನ್ನ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಲ ಮೂತ, ಇದು ಖಾದ್ಯಪದಾರ್ಥ ಉಪದ್ರ ಇನ್ನೂ ಇರುಪುಸದಾಜನೆ ಪ್ರಣಾ ಸಲೋಭನೆಯ ಮೊದಲಿನ ಭಾದಪಪರ್ಥವನ್ನು ಇಡಿರಿ. ಪ್ರಲೋಗಿಭಾಂದು ಮತ್ತ ಹೂಆದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಷಕಗಳಿಗನ್ನು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮಿಕತ ಊದಪದಾರ್ಥನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದಿ.

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳು : ಮನುಷರು, ಪಾಸುವಾರುಗಳಾ ಮತ್ತು ಸಾಕಾಪ್ರಾಣಗಳಿಂದ ದೂರಪಾಗಿ ಇಡಿರಿ. ಮೊಟ್ಟೆಮೊಳಿಗೆ ಪೂರದರೆ ಪಾನಿಕರ ಮರಣ ಸಂಬಸಿಲೂಬಸುದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗದಂತೆ ಪಾಗರೂಕತವೆ ವಹಿಸೇಕರು ಇಧರು ಪುಡಿಯು ಉಸುವಾಲ್ಲಿ ಸೇಕಿಕೊಳ್ಳದು ಜಾಗರೂಕತೆ ಪಡಿಯೇಕು ಆಹಾರ ಪತಾರ್ಥ ಮತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಕೊಡು ಈ ತಮಾಂಕೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಎಷವಾಗಿದ ಇದುನ್ನು ತಿನ್ನುವ ವಸ್ತು ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾಯಬಹುದು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಪೊಂದುವ ಸಂಭಸ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸವೇಡು ಬಳಿಸಿದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ತೂಳೆದು ಅಥವಾ ನಿಷ್ಪಯೋಜಿತ ಆಂಶಗಳನ್ನು ಚಲಿಲ ನೀರನ್ನು ಮಲಿಸಗೊಳಿಸಬೇಡಿದಿ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ಜಿಂಕ್ ಫಾಸ್ಫೈಡ್ ತಯಾರಿಕೆಗಳನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬವರು ಮತ್ತು ಟಿಕರಿಕೆ ಬರುವಂತಿರುದು ಹೊಟ್ಟೆನೊವು ವದ ಚಿಗಿಹಿರಿರುವು, ನಿತ್ರಾಣ ಮುಂತಾದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರು ಕೂಡಲೇ ಪರಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹೂಆದರೆ 1-2 ಗ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಖಡಿದು ಮತ್ತು ಗೀಟಲೆನ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಜಿರಳಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ವಾಂತಿಯಾಗಿಲು ಪ್ರಯೆಬೇಕು ಯಾವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನೂ ಬಳಸಬೇಡಿದಿ. ವಿಪತಗಾಲದಿ ಮನುಷ್ಯವನ್ನು ಮಲಗಿಸಿರಿ. ಪಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲಿದಿದವಾನಿಗೆ ವಂತಿಯಾಗಲು ಪ್ರೇರಿಸಬೇಡಿರಿ ಮತ್ತು ಬಾಯಂದ ಏನನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿರಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕರವಾದರ ತುಂಬಾ ನೀರಿಗಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ : ನೀರಿನಿಂದ ಜರವವನ್ನು ತೂಳೆದು (ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲಾವಜ್) ವಿಷವಸ್ತು ತೆಗೆಯಿರಿ. ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಕಾವರ್ ಸೆಲೂಕ್ಯಶನ್ ಟಕೊಡಬಹುದು ಅಧ ಎವುಟಕ್ (ವಾಂತಿ ಪ್ರೇರಣ) ವಾಗಿಕಲಸಾಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕರಗದ ಕಪ್ರಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೈಡ್‌ನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆಬೇಲ ಅದನ್ನು 1:5000 ಪೊಟಾಶ್ಯಾಕಯಂ ಸರ್ಮಾಂಗನೆಟ್ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲಾಪೇಜ್ ಮಾಡಿ ತಗದುಬಡಬಹುದು. ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮಾಗ್ನೇಸಿಯಾ ಅಥವಾ 2-3 ಮೊಟ್ಟೆಳ ಬಿಳಿಲೋಳೆಯನ್ನು ಗೋಟಬಾಯಿಸಿ ತಗದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಈ ತಮಾನಿಕೆಯ ಮಳಕೆಯು ನಿಯಂತ್ರಣಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವುಗಳಿಗೆ ಸಂಭವನೀಯ ಹಾನಿಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಟಲಡಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ಜಿಪಾಟ್ಯಾರಿ ವಹಿವವುದಿಲ್ಲ.

ಮಾರಾಟಗಾರರು : **ಸ್ವಾಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,**
ರಿಜಿ. ಕಚೇರಿ: ಯುಪಿಎಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ರೆಡಿಮನಿ ಟೆರೇಸ್,
167, ಡಾ. ಆನಿಬೆಸೆಂಟ್ ರೋಡ್, ವರ್ಲಿ, ಮುಂಬಯಿ-400 018, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

रैट फ्री
चूहेमार दवाई

जिंक फास्फाईड

ध्यरउत लही दिदाइतां : रैटोल विच जिंक फास्फाईड ज्रियाशील तॅत्त दे रुपविच है अते इदा हिमारतां, गुदामां, खेतां, बागां, अते दूजीआं थाव्हां ते चूहे-चूहीआं दॅ लुक्काउन लही चेगे वासते वरतिआ जांदा है।

मात्रा :

ध्यरउत दीआं हालतां	हानीकारक जीव	चेगे विच मात्रा	
		मि.ग्रां.	टैव.
1. ढ्रसलां कुरउन वाले चूहिआं दी रैकथाम लही	झड़ीआं दा चूहा खेतां दी चूही	1.5 तॅ 2.5%	1.875 तॅ 3.125%
2. रिहाइशी थाव्हां उॅते सिथहाई धूपध करमचारीआं दी निगरानी हेठां वरउत लही	नरम चमड़ी वाला चूहा अॅन्हा चूहा लॅड़ा चूहा घरां दी चूही कुदी चूही बुरा चूहा		

थां दी चोन : जिंना हॅसके डेंजन अते पाली हटा के अजिहीआं सुॅकीआं तेज़ाब रहिन थाव्हां दा पता करॉ, जिॅथे चूहे अते चूहीआं दॅ चेगा मिले अते उदा धाह। आम तॅत्त ते इदा थाव्हां हन कंधां दे नाल, धुॅडां दे अंदर, धुॅडां दे नेड़ै धुॅजिआं विच, दरज़ अते कंधां विच लुकदीआं थाव्हां विच अते अजिहीआं थाव्हां, जिॅथे चूहे-चूहीआं ज़ां उनां दीआ निशानीआं मिलन।

गेज़े पाउती : चेगा पाउंदे तॅ पहिलां गेज़े पाउंदे लही 5-10 ग्रामु (1-2 छोटे चमचे) षिठां मॅधे, आन्नाज़, छोले अते धाण वालीआं दूजीआं चीज़ां, जिन्हें रॅटी आदि पाउ। इस दॅ उर थां उॅते चेगा पाउंदे तॅ 2-3 दिन पहिलां पाउंदा ज़ुरु करॉ, तां जॅदवाही वाले चेगे दी गेज़े पै जावे।

चेगा : ऊॅहीजिंहे, किसम दे धाने दॅ 2-3% रैट ड्रॅ रला के मॅध लए अते इस विच 5% खंड अते तेल पाउ। सारा चेगा इकॅवारी विच वरउत लए।

जिॅथे गेज़ वाला चेगा सड़ तॅ वॅध धाप्पा गिआ हॅवे अते जिॅथेअटसॅथिआ चेगा धाप्पा गिआ हॅवे केवल उॅथे 5-10 ग्रामु चेगा पाउ। जेकर इदा वगी चेगा पाउ। ने चूहे आउंदे बंद ना हॅन तां चेगा दुबारा पाउ। उॅसे थां उॅते घॅटॅघॅट 2-4 गढ़त्ते चेगा ना पाउ। मरे हॅदे चूहे अते वग्घु बचिआ चेगा चॅगी तरां चुॅक के नशट कर दिउ।

सावधानीआं : मुनॅथां अते पालड़ु, जनवरां दॅ सेथी हॅदी थां तॅ दूर रॅथे। जे दवाई ठिगली जांवे तां धात्तव नां नुकसान दॅदेह ठॅमकती है। चमड़ी नाल लॅगत ते बचाअ करॉ। इस दी धूड़ विच सा्ह ना लवे। चारे अते धान्हां पीत वालीआं चीज़ां दॅ दूशित हॅन तॅ बचाए। तेजाब अते पानी दे संपरक विच ना आउंदे दिउ। इह दवाई जंगली जीवां लही ज़हिरीली है अते सेथिआ हॅदिआं चेगा धान नाल मॅछीआं, पॅछी अते रॅग जंगली जानवर मर सकदे रन। अजिही थां उॅते ना पाउ, जिॅथे वहि के दूजी थां जाणे दी संभावना हॅवे। अॅज़ारा दे धॅन नाल जां वग्घु बची दवाही दॅ नशट करके पाणी दॅ दूशित ना करॉ।

सांड संभाल अते निपटारा : ठंढी, सुॅकी थां उॅते संभाल के रॅथे। सटॅरेज जां निपटारे नाल पाणी, डेंजन जां चारे दॅ दूशित ना करॉ। धुॅल्ली थां विच सुॅटणा मना है। धाली डॅबिआं दी दुबारा वरउॅ ना करॉ। कीज़ेमार दवाही जां धॅन नशट कर दिउ। वरउ हॅदे डॅबे पाणी दी सपलाही तॅ दूर सुरॅखिअत थां उॅते वॅध देणे चाहीदे हन।

ज़हिर ना उॅत्र : गैसट्रिक लैवेज नाल ज़हिर कॅढ दिउ। उलटी 0.2% कापर सलफेट दा घॅल दे के करवाई जा सकती है मेउॅलटी करवाउंदे वाली दवाही है अते अघुलनशील किउिपरिक फास्फाईड बनाउंदी है, जिस दॅ मगरॅं 1.500 पेटाशीअम परमॅगंनेट घॅल नाल गैसट्रिक लैवेज लुआरा कॅढिआ जा सकदा है। इक ऑस मिलक आन्ह मैगनीसीअम जां 2 जां 3 आंड्डिआं दी सड़ेदी डॅंट के दिॅत्ती जा सकदी है।

किउॅंकि इस दवाही दी वरउॅ साड़े वॅस विच नहीं है, इस लही अमसीं संड्डव ध्रत्थी जां आन्दामीआं, जानवरां नां हॅर जीवां दॅ हॅन वाले नुकसान दी कॅही ज़िंमेवारी नहीं लही सकदे।

विक्रेता : **सवाल कारपोरेशन लि.**
रजिस्टरड आफिस: युपीॅएल लिमिटेड, रेडीमनी टेरेस,
167, डा॰ ऐनी बेसेंट रॅड, वरली, मुंबई 400 018, महाराश्टर।

ग्रॅट फ्रि
ईंदुरेर जन्ये

जिङ्क फसफाइड

ब्यवहारेर निर्देशावली : ग्र्याटोल-एर सक्रिय उपादान ह'ल जिङ्क फसफाइड। ग्र्याटोल बाड़ी, गुदाम, माठ, फलेर बागान या तार आशेपाशे आर खोला जायगाय समङ्ग ईंदुर, छुचो वा क्षेतेर ऐ जातीय तीक्ष्ण पशुदेर विनाश करार एक कार्यकरी टोप :

मात्रा :

ब्यापारेर परिस्थिति	जीवजन्तुर अर्गानिजम	टोपेर मात्रा सक्रिय उपादान	टेकनिक्याल
१. माठेर ईंदुर निय़ंत्रणेर जन्ये	ब्र्याटस, ब्र्याटस आर मेटोडस	१.५	१.৮৭৫-
२. वसवासेर गृहे ब्यवहारेर जन्ये प्रशिक्षाप्राप्त व्यक्तिदेर अभिज्ञ तत्त्वाधान दरकार।	क्यासिकोटो वेक्सालेजिस टाटोरा इण्डिका मास बुलगा मास ग्र्याटिग्रिक्स एम. फास्फिकिउलास मेरियोन्स हरियानेन, ब्र्याटास नर्ड्रोगिकास साम्दस केकफेलो	२.५%	३.১২৫%

उपचारेर उपयुक्त इष्टा निर्णय : यतटा सम्भव खाद्य, फल ओ अन्यान्य वस्तु हॅठिये दिये शुकनो आ्यासिडयुक्त हान निर्णय करुन यॅथाने ईंदुर छुचो वा ऐ जातीय तीक्ष्ण कीट टोप देखते पेये तो खेये नेवे। साधारणत : ऐ सब हान ह'ल देओयालेर कोन, छिद्र जायगा वा ईंदुर-गर्त अथवा यॅ सब जायगाय ईंदुर छुचो घोराफेरा करते देखा याय।

टोप फेलार आगे : टोप फेलार २/৩ दिन आगे ৫-১০ ग्राम (১.২ चामच) घरेर सब जायगाय, यॅमन खाद्यशस्य, छोला अथवा रूटिर टुकरो टोप फेलार जायगाय रेखे दिन रातो ठिक सेई सब जायगाय ईंदुर वा छुचो आकृष्ट ह'ये आसते थाके।

टोप फेला : उपचारेर टोप एईभावे तैरी करुन : १ थेके ৩% ग्र्याट फ्री ऐ जातीय खाद्यद्रव्ये मेशान आर तातेते दिन ৫% चिनि आर शस्य तेल। समङ्ग उपचारित टोप एक क्षेपेई प्रयोग क'रे फेलुन।

यॅथाने सेथानेर बेशिर भाग खाद्यद्रव्य वा टोप मिश्रित खाद्य ईंदुर खेये नेय वा खरड हये याय सेई सब जायगाय ৫-১০ ग्राम टोप प्रयोग करुन। एकवार उपचारेई क'रा हॅओया उचित। तवे, ईंदुरेर उॅत्पात चलते थाकले आवार टोप फेलार आगेर सब काज अर्थात खाद्यद्रव्य राखार काज करुन। एकई जायगाय २-৪ सप्ताहेर आगे पुनर्वार उपचार करवेन ना। सब मरा जन्तु प्रहर बाड़ति टोप ठिकमत तुलेनियेइ विनष्ट क'रे फेलुन।

सावधानता : मानुष, गृहपालित पशु वा पॅषमनकों जीव थेके दूरे राखुन, गिलेफेलले मारात्मक अवस्था वा सारीरिक क्षति ह'ते पारे। चामड़ार संस्पर्शे आनवेन ना स्प्रे गुड़ो श्वासेर सङ्गे ग्रहण करवेन ना खाद्यद्रव्य वा पशुखाद्य सुषित हॅओया एड़िये चलवेन। ऍ्यासिड वा जलेर संस्पर्श एड़िये चलवेन। एई ऐखुध वन्यजन्तु वा माछेर पक्षे विषाक्त। पाखी वा अन्यान्य वन्यजन्तुके उपचारेर टोप खाओयालें तादेर मृत्यु ह'ते पारे।

नियमित चलाफेरार जायगाय प्रयोग करवेन ना। प्रयोग यत्नपि वा उॅत्तुङ्ग ऐखुध धूयें जल दूषित करवेन ना।

प्राथमिक चिकित्सा : जिङ्क फसफाइड प्रयोग करार पर यादेर मध्ये गावमिभाव, पेटेर व्यथा, बुकभारी, अथवा दुर्बलतार लक्षण देखा याय तादेर अभिलम्बे डाक्तार देखाना देखानो उचित। गिलेफेलले १-২ ग्लास लवण जल खाईये दिन आर गलाय आङ्गुल चालिये वमि करिये दिन। कोनो तेल व्यवहार करवेन ना। रोगीके शुईये दिन आर गरम करुन। अज्ञान रोगीके वमि करवेन ना अथवा तार मुखेर मध्ये किछु देवेन ना।

संरक्षण आर विनष्टिकरण : ठाण्डा ओ शुकनो जायगाय मजुत करुन। एमन भावे विनष्ट करवेन यातें जल खाद्य वा पशुखाद्य दूषित ना ह'य। खोला जायगाय पुति देओया वा जमा करा निषेध। खालि पात्र पुनर्व्यवहार करवेन ना। उॅद्धत कीटनाशक (या आर व्यवहार करा हवे ना) जलधारा थेके दूरे कोनो निरापद स्थानें पुते फेलुन।

प्रतिषेधक : रोगीके जलमिश्रित ग्यासट्रिक ल्याभेज खाईये विष वार करे दिन। ০.২% कपार सालफेट मिश्रण दिये वमि करान। एई मिश्रण वपन करार ও अद्रावक पिऊिप्रिक्क फसफाइड हिसावे क्रिया करे या परे १.৫০০০ पटाशियाम पार्मानगानेट मिश्रण द्वारा दूर करा याय। रोगीके एक काउॅण्ड मिल्क अफ म्याग्नेसिया अथवा २-৩ टि ट्रिमेर सादा अंश दिते पारेन।

एई उॅत्पादनेर सठिक ब्यवहारेर ওपर आमादेर कोनो नियन्त्रण नाई। ताई मानुष, जीवजन्तु वा अन्य कारोर कोनो सम्भाव्य विफलता वा क्षतिर ब्यापारे आमादेर कोनो दायित्व नाई

विपणनकर्ता : **सोयाल कर्पोरेशन लिमिटेड**
रेजिस्टार्ड कार्यालय : ইউপিএল লিমিটেড, রেডীমনী ট্যারেস,
১৬৭, ডাঃ আনি বেসান্ত রোড, ওর্লি মুম্বই-৪০০ ০১৮, মহারাষ্ট্র।

ৰেট ফ্ৰি
নিপনি এন্দুৰৰ কাৰণে

জিঙ্ক ফছফাইড

ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দ্দেশন : জিঙ্ক ফছফাইডৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী ৰ্যাটোল এৰিধ মিশ্ৰণ। এন্দুৰ নিপনি আদি মাৰিবলে ঘৰৰ বাহিকৃত গুদামত, খেতিপথাৰত, ফলৰ বাগনক্ষতৰা মুকলী ঠাইত ব্যৱহাৰ কৰিব।

মাত্ৰা :

ব্যৱহাৰৰ স্থিতি	জীৱ-জন্তুনাশক প্ৰণালী	মিশ্ৰণ মাত্ৰা এ.আই.	টেকনিক্যাল
১. খেতি পৰাৰত এন্দুৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে	দেটাস, ৰেটাস আৰু মেটোস	১.৫ ৰ পৰা ২.৫%	১.৮৭৫ ৰ পৰা ৩.১২৫%
২. বাসস্থানত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হলে প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত ব্যক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰয়োগ কৰিব	কন্দিকোটা কেণ্ডিকোটা টেটোৱা ইণ্ডিকা মছ বুগসা মছ প্ৰটিক্সিস এম. ফছফিউলাস মেৰিঅনাস হৰিয়ানে, ৰেটাস নৰ্ব্বোগিকাস সকাস কেৰিয়েলেস		

ব্যৱহাৰৰ বাবে হান নিৰবাচন : সুবিধা অনুযায়ীখোৱা খাদ্যপানী আদী ভালদৰে আঁতৰাই ৰাখিব। শুকান এচিড্মুকলি ঠাইত দিৰ যাতে এনদৰ নিগনি তথা অন্য কীট অদিয়ে যোবাৰ পিছত সহজে বিছাৰি পায়। সাধাৰণতে বেৰৰ কোন বা বেৰ আৰু মাটিৰ মাজৰ ঠাইত এন্দুৰ নিগনি আদি দেখিবলে পেবা যায়।

বিনষ্ট কৰাৰ আগত : বিনষ্ট কৰাৰ আগত ৫ /১০ গ্ৰাম মান খোয়া বস্তু বা পাউবুটিৰ টুকুৰা নিৰ্ব্বাচিত ঠাইত ৰাখিব। খোবা খাদ্য পচন্দ হালে বিভিন্নি ঠাইত আখিব।

বিনষ্ট কৰাৰ বাবে : বিনষ্ট কৰাৰ বাবে কিছু খাদ্য বস্তুৰ লগত ১.৯ৰ পৰা ৩.২% ৰেটোল হিমলাই তাৰ লগত ৫% কে চেনি আৰু মাটেকৰ তেল দিব। এই খাদ্য বস্তু বোৰ আটাইই বোৰ ঠাইত একে সময়াতে ৰাখিব।

বিনষ্ট কৰাৰ বাবে যত খাদ্যবস্তুবোৰ ৰখা হয় যাতে ৫ /১০ গ্ৰাম জহৰ মিশ্ৰিত খাদ্যবস্তু ৰাখিব। মাত্ৰ এবাৰহে ব্যৱহাৰ কৰিব। এন্দুৰৰ উপদেৰ বাচিলে আকো ব্যডাৰ কৰিব।

বিনিষ্ট হোবা ঠাই বোৰত ২ /৪ সপ্তাহ পৰ্যন্ত প্ৰয়োগ নাকণিব বাকি থকা খাদ্য আৰু মৰা এন্দুৰ বোৰ সংগ্ৰহ কৰি পেলাব।

সাবধান : মানুহ তথা ধৰচিয়াজীব-জন্তু ৰোবৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। নহ'লে বহুতো অনিম টহৰ পাৰে। গাৰ ছালৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। ধুলি আদি ফুৰাই নিদিব। খাদ্য বস্তু অথবা পানী দূষিত হবলৈ নিদিব এচিড় আৰু পানীৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। বনবীমা জীৱ-জন্তু তথা মাছৰ বাবে ই বিষাক্ত। পক্ষী তথা বনবীমাপক্ষী আদিয়ে এই খাদ্যখালে বিনষ্ট হব। সদায় একেটা ঠাইত প্ৰয়োগ নকৰিব। দূষিত বানীত কেতিয়াও বস্তু পৰিস্কাৰ নকৰিব।

প্ৰাথমিক চিকিৎসা : কোনো বক্তিয়ে যদি জিঙ্ক ফছফাইদ প্ৰয়োগ কৰে তাৰ সাধাৰনতেপেটৰ বিষ বুকুৰ বিষ বা দুৰ্বলতাৰ লক্ষণে দেকা দিবে। তেতিয়া লগে লগে ডাক্তৰৰ চিকিৎসা লব দিব। যদি গিলি দিয়ে তেতিয়া ১ /২ গিলাচ নিমখ পানী খুৱাই দিব। কোনো ধৰণত তেল ব্যবহাৰ কৰিব দিব ব্যক্তি জনক গৰম ঠাইত শুৱাই ৰাখিব। অচেতন হোৱা বক্তিৰ মুখেৰে বমি কৰিব নিৰ্দিষ্টি। ছাল আৰু চকুত প্ৰচুৰ পৰিমানে পানী ঢালিব।

সংগ্ৰহ আৰু বিনষ্টতা : ঠাণ্ডা আৰু শুকান ঠাইত ৰাখিব। মুকলৈ ঠইত জ্বলাই নিদিব আৰু পলোই নিদিব। খালি টিনবোৰ ব্যৱহাত নকৰিব। পানী ঠাইৰ দূৰত গৰ্তে খাদ্দি টিনবোৰ পুতি পৰ।

বিষ নিবাৰক : গেষ্টিকৰ সৈতে বিছপানী উলিয়াই দিমক ০.২% কপাৰ ছালফেট মিশ্ৰণোৰে বমি কৰক। বমি কৰিবলৈ কিউপ্ৰিক ফছফাইড তৈয়াৰ কৰি ১:৫০০০ পটেছিয়াম পাৰমেঙ্গানেট দ্ৰব্য প্ৰয়োগ কৰিব। এক আউন্স মিল্ক আৰু মেগনেছিয়াম তথা ২ /৩টা কণীৰ কুহুমটো ৰাদ দি মিহলাই দিব।

উৎপাদন আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণত যদিও কোনো মানুহ জীৱ-জন্তু আদিৰ ক্ষতি হলে তাৰ বাবে আমি দায়ী নহয়।

মাৰ্কেট কৰিছে : এছডব্লিউএএল কৰ্পোৰেছন লিমিটেড
পঞ্জীকৃত কাৰ্য্যালয় : ইউপিএল লিমিটেড, ৰেডীমানী টেৰেছ
167, ডাঃ এ. বি. ৰোড, ৱৰ্লি, মুম্বাই - 400 018, মহাৰাষ্ট্ৰ

ریٹ فری
روڈنٹیسائیڈ

زنک فاسفائیڈ

استعمال کرنک طریقہ:

ریٹول دلاون وڈلس-تھہ دواس منز چھ اہم چیز زنک فاسفائیڈ، یہ چھ مختلف چیزن نقصان واتھاون وان کمن تہ جانورن مارنہ کھیتر ے استعمال گوان ہنٹلا گگو وغیرہ،، یہ چھ تمن سارنی کمن تہ جانورن مارنہ کھیتر استعمال گوان یم ژمیٹس منز، مکانن منز، گودامن منز، باغن منزآسن چھ۔

خوراک استعمال:

استعمال کرنچ حالہ	یمن جانورن کھیترے استعمال چھ گوان	خوراکچ مقدار
۱ زمینس نقصان واتھاون ویل جانور	مثلا: گگو، سرف، بنی امے	اے آئی: 1.5 تہ 2.5 فیصد
۲ گرین منز، یا یمن چاین انسان بسان آسن، تجربہ تھاون وان ہنز نگرانی منز استعمال کرنہ کھیتر	قسمک جانور گرین منزآسن ویل سارنی کمن کھیتر، ہنٹلا بلی ڈوگس ٹترے، اٹریاس، بوڈوکاس پلیٹس کس، ایم سسلز، ام ہاوہ سیری تم یم کم تہ جانور یم گرین منز آسن چھ۔	ٹیک: 1.875 تہ 3.125 فیصد

تم جائی یت بیک استعمال چھ گوان:

کمن چن چیز، آب، بنی سٹورک تمام سامان ہٹاونہ بعد واچ تہ اس مقدار ریٹ یس تھ جائی کھیتر کافی گوو، ام پت ترییا تمن جائی یت لگون تہ دیگر کمن تہ جانورن ہنز آسک زیادہ امکان آسہ۔ خاص کرد یوارن منز، سیلنگ منز، فرنیچرس حل، بنی دیوارن بندن کونن منز، یا تم جائی یت تھیڈ نشان آسن۔

عام استعمال یوتھ کرنچ کم:

کمن تہ جانورن کھیتر واستعمال کرنہ یوتھ دون ترن دھون تامتھ چھ بہتر یہ کہ پانژ، دھ گرام (اکھ زوچ) کمن چاین تھاون یت کمن پنک عام استعمال کہ سامان (دال، چمل، ژومٹ، کھنڈ وغیرہ) آس، یکن چاین چھ گگون تہ دیگر نقصان واتھاون وان جانورن ہنز یاد امکان، تھہ پیٹھ گوھ تیجو نہ زیادہ کھوت زیادہ شکار۔

دواملاوک طریقہ:

زہ، ترہ فیصد دواچھ آٹس، ژوچہ، بریڈ یا بنی کن کھکس چیزس منز ملاون، اتھہ ستھہ چھ ترا ون تقریباً پانژ فیصد کھنڈ تہ بنی کھن تیل، یہ سوری منیئر یل ملاونہ پتہ بنایو پیٹوان دمن گرامن بند لک لک نگرہ۔

ہرنگرد، بنی تھاوتس جائی یت گگلو اتھہ یکن کھیتھ لیکن اگر نگلو دیم نگرد کھسنی نہ ترن ژوردن ہنٹلن تامتھ چھن یہ دانی تمنیہ جاین ترا ون، البتہ یہ وجایو پیٹہ گوھ مرت گگلو دیگر یکم تہ بنی سیری بانتہ ین۔

احتیاطی تدبیر:

یہ دوا گوھ تہ انسان تہ بنی دیگر پالتو جانورن نش دورین تھاونہ، پی تمن جاین نش تہ دورین تھاونہ یت انسان آسہ وتھان یمین، کیاذکہ اگر یہ دوا کھن آو یہ چھی دارہ نقصان دہ، جسمہ نش بنی کھن چن چیزن نش دورتھاون، آیش بنی یتی چیز نش تہ دورتھاون، یہ دوا چھ جنگلی جانورن، گاژن بنی پرندن کھیتر ہ تہ نقصان دہ، اتھ ستھہ ہکمن کم مرتھہ، لہذا ایسن جاین نش چھ راحتیاط برتن، عام استعمالک بانن نش تہ چھ یہ دوا دورتھاون۔

فرسٹ ایڈ (فوری علاج)

اگر استعمال کران کران یہ دوا کھن آو، یا اگر کیئہ اکہ وجہ ستھہ الٹی باسہ، یا معدس منز تکلیف باسہ، سنس پیٹھہ دباؤ باسہ، یا ایس منزنو

285mm.

210mm.

रेट फ्री

चूहों के लिए

जिंक फॉस्फाइड

इस्तेमाल के लिए निर्देश: रेटोल में सक्रिय तत्व के रूप में जिंक फॉस्फाइड है और इसका इस्तेमाल चूहें, चुहिंयों तथा भवनों में तथा उसके आसपास, गोदामों, खेतों, बागानों और दूसरे बाहरी इलाकों में पाए जाने वाले कृन्तकों की रोकथाम के लिए चारे के रूप में किया जाता है.

निर्धारित मात्रा:

इस्तेमाल की दशाएं	कीट सूक्ष्म जीव	चारे में निर्धारित मात्रा स.त.	टेक्नि.
१. खेत के चूहों की रोकथाम के लिए	रैटुस, रैटुस आर मेट्टोडा	१.५ से २.५%	१.८७५ से ३.१२५%
२. रिहायशी परिसरों में प्रशिक्षित कर्मचारियों की विशेष देखभाल में इस्तेमाल किया जाना चाहिए	बैंडीकोट बेंगालोन्सिस टाटेरा इंडिका मुस बूड्गा मुस प्लेटीथ्रिक्स एम मुस्कुलुस मेरियोनॉस हरिकेनाई रैटुस नॉर्वेगिकस सैंकस केयरुलेन्स		

उपचार के क्षेत्रों का चयन: खाद्य पदार्थों, पानी और जूठन आदि को ज़्यादा से ज़्यादा साफ करने के बाद उन जगहों को सूखा एसिड–मुक्त रखने की कोशिश करें, जहां चूहें, चुहिंया और कृन्तक मौजूद हो सकते हैं तथा चारे को खा सकते हैं. आमतौर पर ये स्थान होते हैं दीवारों पर खोदे गए हिस्से या बिलों के आसपास की जगहें, कोने–किनारों और केसीलड स्थानों पर, फर्श तथा दीवारों के बीच की जगहें, जहां चूहें, चुहिंया हों या उनके निशान देखे गए हों.

चारा रखने से पूर्व: स्थानीय रूप से उपलब्ध आहार जैसे कि अनाज, चना और खाने की दूसरी चीजों जैसे कि ब्रेड/रोटी के ५–१० ग्राम (१–२ छोटे चम्मच) प्रत्येक चारा रखने की जगह पर उपचारित चारा रखने से दो या तीन पूर्व रखें ताकि चूहों की उपचारित चारे को ग्रहण करने की संभावना बढ़ जाए.

चारा रखना: ऊपर उल्लेख किए गए प्रकार की खाद्य–सामग्री में शक्कर और कॉर्न ऑयल प्रत्येक के ५% के साथ २–३% रेटोल मिलाकर उपचारित चारा तैयार करें. तैयार किए गए समस्त उपचारित चारे का एक बार में ही इस्तेमाल कर लें.

जहां सबसे अधिक उपचार –पूर्व चारे को खाया गया हो और उसे खत्म किया गया हो, उन्हीं स्थानों पर ५–१० ग्राम उपचारित चारे को रखें. केवल एक बार ही उपचार करें. अगर चूहों का उत्पात जारी रहे तो उपचार–पूर्व चारे का दोबारा इस्तेमाल जारी रखें. एक ही स्थान को २–४ हफ्ते से पहले उपचारित न करें. सभी मरे हुए जीवों और अतिरिक्त चारे को इकट्ठा करके उसका उचित तरीके से निपटारा करें.

सावधानियां: उपचारित चारे को मनुष्यों, पालतु पशुओं और पक्षियों से दूर रखें. निगले जाने पर यह जानलेवा या हानिकारक हो सकता है. त्वचा पर लगने से बचाएं . चारे की धूल/धुंध में सांस न लें. आहारों या खाद्य–पदार्थों को जहरीला होने से बचाएं. एसिड्स और पानी से इसका सम्पर्क न होने दें, यह उत्पाद वन्य प्राणियों तथा मछलियों, पक्षियों या अन्य जीवों के लिए जहरीला है तथा उपचारित चारा खाने से उनकी मृत्यु हो सकती है. ऐसी जगह इस्तेमाल न करें जहां से उनके छिटक जाने की संभावना हो. उपकरण को साफ करके या अनुपयोगी पदार्थ का निपटारा करते समय पानी को प्रदूषित न करें.

प्राथमिक उपचार: अगर जिंक फॉस्फाइड के उत्पाद का इस्तेमाल करने वाला कोई व्यक्ति मतली, पेट में दर्द, छाती में जकड़न या कमजोरी की शिकायत करे तो तुरन्त डॉक्टर को दिखाना चाहिए. अगर उत्पाद को निगल लिया गया हो तो १–२ गिलास नमक मिला पानी मिलाकर तथा गले के पीछे की तरफ गुदगुदी करके उल्टी कराने की कोशिश करें. सभी तेलों के इस्तेमाल से बचें. व्यक्ति को लिटा दें और उसे गर्म रखें. बेहोश व्यक्ति को उल्टी कराने या मुंह से कुछ देने की कोशिश न करें. अगर आखों या त्वचा में लग जाए तो भरपूर पानी से उसे धोयें।

भंडारण तथा निपटान: किसी ठंडी और सूखी जगह पर भंडारण करें. भंडारण या निपटान के कारण पानी, खाद्य–पदार्थ या आहार को प्रदूषित न होने दें. इसे खुले में जलाना या फेंकना मना है. खाली डिब्बों का दोबारा इस्तेमाल न करें. इस्तेमाल न की गई दवा और खाली डिब्बों को पानी के स्रोतों से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ दिया जाना चाहिए.

औषधोपचार: पानी के साथ गैस्ट्रिक लावेज द्वारा जहर को शरीर से निकालें. ०.२% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देकर, जो कि उल्टी कराने का काम करता है, उल्टी कराने की कोशिश करें, इससे अघुलनशील क्यूप्रिक फॉस्फाइड पैदा होता है, जिसे बाद में १.५००० पोटेशियम परमैग्नेट सॉल्यूशन के साथ गैस्ट्रिक लावेज द्वारा बाद में शरीर से निकाला जा सकता है. एक आउन्स मिल्क ऑफ मैग्नेशिया या २ या ३ अंडे की जर्दी भी फेंटकर दी जा सकती है.

उत्पाद के इस्तेमाल पर हमारा कोई नियंत्रण न होने के कारण हम इसके विफल होने की संभावनाओं या मनुष्यों, पशुओं या दूसरों को होने वाली किसी क्षति के लिए जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं.

विक्रेता : स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय : यूपीएल लिमिटेड, रेडिमनी टेरेस,
१६७, डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई–४०० ०१८, महाराष्ट्र.

Rat Free

RODENTICIDE

Zinc Phosphide

Directions for use: Ratol contains Zinc Phosphide as its active ingredients and used as a rodent bait against rats, mice and other field rodents in and around buildings, godowns, fields, orchards and other outdoor areas.

Dosage:

Conditions of Use	Pest Organism	Dosage in Bait A.I.	Tech.
1. For field rodent control	Ratus, Rattus R. Mettoda	1.5 to 2.5%	1.875 to 3.125%
2. In residential Premises to be used under the expert supervision of trained personnel.	Bandicote bengalonsis Tatera Indica Mus booduga Mus Platythryx, M. musculus Meriones hurrianae Rattus norvegicus sancus caerulens		

Selection of Treatment Areas: After removing as much food, water and harbonage as possible, determined dry acid-free areas where rats, mice and rodents will most likely find and consume the bait. Generally these areas are along walls, by gnawed openings in or beside burrows, in corners and concealed places between floors and walls or in locations where rats and mice or their signs have been observed.

Pre-baiting: Pre bait with 5-10 grams (1-2 tea spoons) of untreated locally available food like cereals, grams and other eatables like bread etc. in each bait station, two or three days prior to baiting to increases acceptance of treated baits at various bait stations.

Baiting: Prepare treated baits by mixing 2-3% Ratol with similar kind of food material along with 5% each of sugar and corn oil. Use all treated baits in one operation.

Apply 5-10g. of bait where most of prebait is eaten and only to areas where untreated bait was consumed. Treat only once. If rodent nuisance continues repeat prebaiting. Do not treat the same area at less than 2-4 weeks. Collect and dispose of all dead animals and excess bait properly.

Precautionary Statements: Keep way from humans, domestic animals and pets. May be fatal or harmful if swallowed. Avoid skin contact. Do not breath dust. Avoid contamination of feed or food stuffs. Avoid contacts with acids and water. This product is toxic to wild life and fish, birds and other wildlife feeding on treated bait may be killed. Do not apply where run-off is likely to occur. Do not contaminate water by cleaning of equipment or disposal of wastes.

First Aid: Any person applying Zinc Phosphide products and experiencing signs and symptoms such as nauses, abdominal pain, tightness in the chest or weakness should be seen by a physician immediately. If swallowed drink 1-2 glasses of salt water and induce vomiting by touching the back of the throat with the finger. Avoid the use of all oils. Have person lie down and keep warm. Do not induce vomiting or give anything by mouth to an unconscious person. If on skin or in eyes, flush with plenty of water.

Storage and Disposal: Store in a cool, dry place. Do not contaminate water, food or feed by storage of disposal. Open burning and dumping is prohibited. Do not re-use the empty container. Pesticide or rinsate that cannot be used and containers should be buried in a safe place away from water supplies.

Antidote: Remove poison by gastric lavage with water. Vomiting can be induced by giving 0.2% Copper Sulphate solution which acts as an emetic and also produce insoluble cupric phosphide which can be later removed by gastric lavage with 1.5000 potassium permanganate solution. One ounce of milk of magnesia or beaten white of 2 or 3 eggs may be given.

Since the use of the product is beyond our control, we cannot assume any responsibility for possible failures or damages caused to men, animals or others.

Marketed by : SWAL CORPORATION LTD.,
Regd. Office: UPL LTD., Readymoney Terrace,
167, Dr. A. B. Road, Worli, Mumbai - 400 018, Maharashtra.

रॅट फ्री

उंदरांसाठी

झिंक फोस्फाइड

उपयोगासंबंधी सूचना : रेटॉलमध्ये झिंक फॉस्फाइड हे क्रियाशील घटक–द्रव्य असून त्याचा उपयोग घरे व त्यांच्या अवतीभोवतीचा भाग, गोदामे, शेते, फळबागा आणि इतर मोकळ्या जागामध्ये वावरणाऱ्या व बिळे करून राहणाऱ्या उंदीर, घुशी व कुरतडून नासाडी करणाऱ्या इतर प्राण्यांना आमीष ठेवून ठार मारण्यासाठी होतो.

मात्रा :

वापरण्यायोग्य परिस्थिती	प्राणी जात	आमीष म्हणून मात्रा सक्रिय घटक द्रव्य	टेक्निकल
१) शेतातील उंदीर व अन्य कुरतडणाऱ्या प्राण्यांच्या बंदोबस्तासाठी	रॅटस, रॅटोस आर. मेतोडा	१.५ ते २.५%	१.८७५ ते ३.१२५%
२) राहात्या घरातून वापरताना प्रशिक्षित व जाणकार व्यक्तीच्या देखरेखीखालीच वापरावे	बंडीकोटस, बेंगालोन्सिस, टॅटेरा इंडिका, मुस बुडगा, मूस प्लोटेथिक्स एम. मस्क्युलस, मेरिओन्स हरिआने, रेटुस, नॉर्वेजिक्स, सॅक्स केरुलेन्स		

उपयोगासाठी जागेची निवड : शक्य होईल तितके करून उपयोग करण्याच्या जागेच्या आसपासच्या भागातून अन्न, पाणी इ. वस्तू हलवाव्यात. नंतर जेथे उंदीर, घुशी आणि कुरतडणारे प्राणी यांचा वावर असतो अशा कोरड्या आम्लयुक्त जागा निवडा, की जेथे ते प्राणी आमीष म्हणून ठेवलेले औषध खातील. सामान्यपणे भिंतीच्या बाजूने त्यांचा वावर असतो. तसेच कोने कोपरे, संदी–फटी, खड्ड्यातून, वरून न दिसणाऱ्या बिळातून, लाद्या व खालील जमीन यामधल्या पोकळ जागेतही वावरतात अशा किंवा ज्या जागी त्यांचा वावर आढळून आला असेल अशा जागा निवडाव्यात.

आमीष देवण्याआधी : आमीष देवण्याआधी ५–१० ग्रॅम (१–२ चमचे) खाद्यपदार्थ – कच्चे धान्य, कडधान्ये किंवा पाव इ. वस्तू २–३ दिवस आधी तरविलेल्या सर्व जागी ठेवा. म्हणजे नंतर रेटॉल मिसळून ठेवलेले आमीष खाण्यासाठी उंदिर–घुशी हमखास येतील.

आमीष देवणे : नंतर आमीषासाठी म्हणून केलेल्या पदार्थात २ ते ३% रेटॉल आणि सुमारे ५% साखर तसेच मक्याचे वा अन्य तेल मिसळा आणि ते आमीष वरील जागी एकाच वेळी देवा.

ज्या ठिकाणी प्रथम आमीष खाल्ले गेल्याचे आढळले असेल तेथे आणि तसे आमीष ठेवलेले नसेल तेथेही आमीषयुक्त रेटॉलच्या ५–१० ग्रॅमच्या गोळ्या करून ठेवा. हा प्रयोग फक्त एकाच करा. नंतरही ह्या प्राण्यांचा उपद्रव चालू राहिल्यास वरीलप्रमाणेच प्रथम साधे आमीष आणि नंतर औषध युक्त आमीष असा प्रयोग करा. मात्र २–४ आठवड्यांच्या आत वरील प्रयोग पुन: करु नका. मेलेले प्राणी गोळा करुन त्यांची विल्हेवाट लावा आणि बाकी राहिलेले आमीष देखील सुरक्षितपणे नष्ट करा.

सावधगिरी : माणसे, घरातील पाळीव प्राणी व पक्षी यापासून दूर ठेवा. गिळले गेल्यास प्राणघातक ठरु शकेल. अंगाला लागू देऊ नका. श्वासावाटे आत घेऊ नका. जनावरांची दाण–वैरण, माणसांचे खाद्य पदार्थ दूषित होऊ देऊ नका. आम्ले व पाणी यांच्याशी त्याचा संसर्ग होऊ देऊ नका. वन्य पशु–पक्षी आणि मासे यांना हे उत्पादन विषारी आहे. प्रयोग – आमीष खाल्ले गेल्यास वन्य पशुंची मरतील. ते वाहून जाण्याची शक्यता असेल अशा ठिकाणी वापरु नका. ते तयार करण्यासाठी घेतलेली भांडी किंवा वाया गेलेले जादा आमीष यांनी पाणी व पाण्याचे साठे दूषित करु नका.

प्रथमोपचार : झिंक फॉस्फाइडयुक्त उत्पादनांचा उपयोग करणाऱ्या कोणाही व्यक्तीच्या मळमळ, पोटात दुखणे, छाती घरणे किंवा अशक्तपणा यासारखी लक्षणे दिसली किंवा त्या व्यक्तीला वाटू लागली तर ताबडतोब डॉक्टर्ना बोलवा. गिळले गेले असल्यास, १–२ ग्लास मिठाचे पाणी प्यायला देऊन आणि घशात बोट घालून उलटी करवावी. कोणत्याही प्रकारच्या तेलाचा उपयोग करु नये. रुग्णाला निजावयास सांगून उबदार पांघरुण घालावे. बेशुद्ध व्यक्तीच्या बाबतीत मात्र उलटी करवू नये किंवा तोंडावाटे काहीही देऊ नये. अंगाला लागले असेल वा डोळ्यात गेले असेल तर भरपूर पाण्याने अंग व डोळे स्वच्छ करावेत.

साठवण व विल्हेवाट : थंड व कोरड्या जागी ठेवा. पाणी, अन्न किंवा चारा–वैरण दूषित होईल अशा प्रकारे साठा करु नका. मोकळ्या जागी जाळून टाकण्यास किंवा फेकण्यास मनाई आहे. रिकामा डबा–खोका पुन: वापर नका. उरलेले कीटकनाशक किंवा ते ठेवलेले डबे–खोके पाण्याच्या पुरवठ्यापासून दूर सुरक्षित जागी पुरुन टाकावेत.

विषबाधेवर उतारा : पाण्यासोबत गॅस्ट्रिक लॅव्हेज देऊन विष काढून टाकावे. ०.२% कॉपर सल्फेट मिश्रणाचे द्रावण प्यायला देऊन उलटी करवावी. हे द्रावण उलटीकारक म्हणून तसेच अविद्राव्य क्युप्रिक फॉस्फाइड तयार करण्याचे कार्य करते. हे क्युप्रिक फॉस्फाइड मागाहून १.५००० या प्रमाणात पोटॅशियम परमॅगनेटचे द्रावण देऊन गॅस्ट्रिक लॅव्हेज करावे किंवा एक औंस मिल्क ऑफ मॅग्निशिया किंवा २–३ अंड्याचा पांढरा बलक द्यावा.

या उत्पादनाचा वापर आमच्या नियंत्रणाबाहेर असल्या कारणाने मानसे, जनावरे या अन्य कोणी यांचे काही नुकसान झाल्यास वा अपायकारक ठरल्यास त्यांची जबाबदारी आम्ही घेणार नाही.

विपणन द्वारा : **स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,**
नोंदणीकृत कार्यालय: युपीएल लिमिटेड, रेडीमनी टॅरेस,
१६७, डॉ. ॲनी बेसन्ट रोड, वरळी, मुंबई–४०० ०१८, महाराष्ट्र.

રેટ ફ્રી

ઉંદરોને માટે

ઝીંક ફોસ્ફાઇડ

વાપરવાની સૂચના : રેટૉલમાં ઝીંક ફોસ્ફાઇડનું અસરકારક તત્વ સમાયેલું છે અને તે ઉંદરો તથા અન્ય કરડી ખાનારા જીવજંતુઓ લલચાવીને પ્રલોભન આપીને મારવા માટે વપરાય છે. તે ઘર અને તેની આજુબાજુની બિલ્ડિંગો, ખેતર, વખારોમાં, બાગમાં અને ખુલ્લી જગ્યામાં વપરાય છે.

માત્રા :

વાપરવાની રીત	જીવજંતુઓનું ઓરગેનીયમ	ડોસેજની માત્રા સ.ત.	ટેકિનકલ
૧) ખેતરમાં જીવ જંતુઓ માટે	રૅટ્સ, રેટ્સ આર. મેટોડા	૧.૫– ૨.૫%	૧.૮૭૫ – ૩.૧૨૫%
૨) ઘરમાં વાપરવા માટે અનુભવી જાણકારના હાથે નીચે	બૅન્ડીકોટ બેંગાલોન્સિસ ટેટેરા, ઈંડીકા મસ બુડ્ગા મસ પ્લેટીથ્રિક્સ એમ. મસ્ક્યુલસ મેરીઓન્સ હરીઅૅન રૅટ્સ નૉર્વેજીકસ સૅકસ કેરૂલેન્સ		

જગ્યાની પસંદગી : સૌ પ્રથમ તો શકય હોય એટલે ખાદ્ય પદાર્થ, પાણી અને રક્ષણ આપનારી જગ્યા સાફ કરી સૂકી એસિડ મુક્ત જગ્યાઓ જ્યાં ઉંદર તથા અન્ય જીવજંતુઓ ખોરાક શોધવા જતા હોય તે જગ્યા નક્કી કરો. સામાન્ય રીતે તો દિવાલ સાથે, કાટવાળી ખુલતી બંધ જગ્યાએ, દૂરમાં અથવા તો તેની આજુબે, દિવાલ તથા તેના નમિયાની વચ્ચે અથવા તો જ્યાં ઉંદર દેખાયા હોય ત્યાં.

પ્રલોભન આપવા પહેલા : ૫–૧૦ ગ્રા. (૧–૨ ચમચી) ખાદ્ય પદાર્થ જેવા કે ધાન્ય અને અનાજ અથવા તો પાઉના ટુકડા વગેરે સાથે ભેળવીને વિવિધ જગ્યાએ લલચાવ્યા પહેલા ૨–૩ દિવસ મૂકો. જેથી કરીને દરેક જગ્યા તેની સ્વીકાર થઇ જશે.

પ્રયોગ : લલચ માટે તૈયાર કરેલા પદાર્થમાં ૨ થી ૩% રેટૉલને ૫% સાકર અને ઘઉં અથવા મકાઇના તેલમાં ભેળવીને દરેકને એકજ રીતે સક્રિય અમલી બનાવો.

જ્યાં પ્રયોગ પહેલાં ખાદ્ય પદાર્થો મૂક્યા હોય ત્યાં અને જ્યાં પ્રલોભન વગરના ખાદ્ય પદાર્થો વપરાયા હોય ત્યા ૫–૧૦ ગ્રા. નો પ્રયોગ કરવો. આ એકજ વાર કરવો. જો ઉંદરોનો ત્રાસ ઘટાયો ન હોય તો ફરીથી પ્રલોભન આપતા પહેલાની પ્રક્રિયા કરવો. જ્યાં આ પ્રયોગ કર્યો હોય ત્યાં ૨–૪ અઠવાડિયા સુધી ફરીથી પ્રયોગ કરવો નહીં. મરેલા જીવજંતુઓને અને વધેલા ખોરાકને એકઠા કરી તેનો નાશ કરો.

સાવચેતી : માનવો તથા પાળેલા પ્રાણીઓથી દૂર રાખો. જો ગળી જવાય તો તે પ્રાણઘાતક નીવડી શકે. ચામડીના સંપર્કમાં આવવા દેશો નહીં. શ્વાસમાં લેવાનું ટાળવું. ખાદ્યસામગ્રી અને ખાદ્યવસ્તુઓની સંપર્કમાં આવવા દેશો નહીં. એસિડ અને પાણીથી દૂર રાખો. આ ઉત્પાદ જંગલી જનાવરો અને માછલીઓ માટે વિષમય છે. પંખીઓ તથા અન્ય જનાવરે જો તેના વડે જોમવેલા પદાર્થો ખાતા હોય તો તેઓનો નાશ થવાની શક્યતા છે. જ્યાં રન ઓફ થવાની શક્યતા છે ત્યાં આને પ્રયોગ કરવો નહીં. પ્રયોગ વાળા વાસણોને પાણી વડે સાફ કરવું નહીં.

પ્રાથમિક સારવાર : જે વ્યક્તિએ ઝીંક ફોસ્ફાઇડનો પ્રયોગ કર્યો હોય અને ઉબકા, વડ્સર આવવા, છાતીમાં દુ:ખાવો અને અચંત ઢીલાપણું લાગતું હોય તો તરત ડોક્ટરને બોલાવો. જો ગળી જવાય તો ૧–૨ ગ્લાસ મીઠાનું પાણી પી ગળામાં આંગળી નાખી, ઉલટી કરાવો. તેલનો ઉપયોગ કરશો નહી. વ્યક્તિને ગરમી ને હુંફ આપો. બેભાન વ્યક્તિને મોઢા વડે કશું આપશો નહીં. તરત ઉલટી કરાવશો નહીં. જો ચામડી અને આંખ ઉપર લક્ષણ દેખાય તો પુષ્કળ પાણી વડે સાફ કરો.

સંગ્રહ અને નિકાલ : અત્યંત ઠંડી અને સૂકી જગ્યામાં રાખો. પાણી તથા ખાદ્ય પદાર્થોનો સંપર્ક, સંગ્રહ અથવા નિકાલ વખતે થવા દેશો નહીં. ખુલ્લામાં બાળવું અથવા ઉકરડી કરવાની સખત મનાઈ છે. ખાલી ડબ્બાનો ફરીથી ઉપયોગ કરવો નહીં.પેસ્ટિસાઇડ અથવા તો રીનસેટ જે ફરીથી વાપરી શકાય ન હોય અને ખાલી ડબ્બાને પાણીથી દૂર જગ્યામાં દાટી દેવું.

વિષ નિવારણ : ઝેરને ગેસ્ટ્રીક લેવેજ અને પાણી વડે બહાર કાઢો. ૦.૨% કોપર સલ્ફેટના મિશ્રણ વડે ઉલટી કરાવો. જે ઉલટી કરાવે તેવું દ્રવ્ય છે અને તે ન ઓગળે એવે એક, ક્યૂપ્રિક ફોસ્ફાઇડ પણ ઉત્પન્ન કરે છે. પાછળથી ગેસ્ટ્રિક લેવેજ અને ૧.૫૦૦૦ પોટેશિયમ પરમેગ્નેટ સોલ્યુશન એક આઉન્સ મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા અથવા તો ૨ થી ૩ ઇંડાનો સફેદ પદાર્થ આપી શકાય.

આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ અમારા કાબુમાં ન હોવાને કારણે તેની નિષ્ફળતા અથવા તો તેના વડે માણસો અને જનાવરને થયેલી ઈજા માટે અમે કોઇ જવાબદારી લઇ શકતા નથી.

વિક્રેતા : **સ્વાલ કૉર્પોરેશન લિ.,**
નોંધણીકૃત કાર્યાલય : યૂપીએલ લિમિટેડ, રેડીમની ટૅરેસ,
૧૬૭, ડૉ એની બેસન્ટ રોડ, વર્લી, મુંબઈ–૪૦૦ ૦૧૮, મહારાષ્ટ્ર.

ர்ரட் ஃ்ரீ

எலுகல கொரகு

ஜிங்க் ஃபாஸ்ஃபைட்

வாடுபடுக சூசனல் : ரேடோல் ஜிங் ஃபாஸ்ஃபைட் மந்து தினுபு கல எலுக ஜாதி எர. தீனி இண்டலோனு கிட்டுகுமலலோனு. பாலாலலோனு, பண்டுதோட்டலலோனு இங்க இதர சோட்டனு, சுலுக்லனு, துமுமுலனு இங்க இதர எலுகா ஜாதி ஜநுலுபுலனு சம்பூடுகே வாடவுபடுனு.

மோதாது

வாடே ஸ்தலமு	ஜந்துவு ஜாதி	எர மோதாது மந்து தினுமு	டெக்னிகல்
1. பாலாலலோ எலுக ஜாதுல பிரசாரனலு	ரேட்ஸ் ரேட்ஸ் ரா. மெட்டாஃப்	1.5% மந்தி	1.875 நுந்தி
2. இண்டலோ சிக்ஷண பொந்தின விபுணுலு பரிவீக்ஷணலோ வாடநலேம	பாண்டிகோட்டா பேங்காலென்ஸிஸ் டாட்டேரா இண்டிகா மஸ் பீஹுகுர மஸ் மஸ்க்யுலஸ் மெரியோன்ஸ் ஹரியானோ ரேட்ஸ் நார்வேஜிகஸ் சாகஸ் காயர்லன்ஸ்	2.5%	3.125%

உபயோகிஞ்சே ஸ்தலமு எம்பிக : நீலலுநுனுண்ட வரகு அகுரசுபதார்தமுலு, ஏல்லு தாடுகோகல வஸ்துலு பரிதாலநு தீசிகோ, அவுநுரகுன்ன ஸ்தலமுலனு எம்பகோவலெனு சாதாரணமுகா கோடல அம்பலு, பாகுல்லு, பரியல அம்பலு மூலலு, வாடுஸ்தானுலு, எலுகல பரிதாலு சம்பாரம் கலிபிம்பின தோட்லு ஈ பரதி மம்பதி.

எர பெட்டுடக பூர்வமு : எரமு பாகா தினகாகலுண்டுலே. எர பெட்டுடகு ரெண்டு மூடு ரோஜுல பந்துகா ஏர பெட்டு ஸ்தலாலலோ ஒக்கடிகுவோட 5-10 ஗்ராமுல (1-2 டீ ஸ்பூன்லு) மாமூலு ஆஹர பதார்தாலு, அநா தான்யமுலு பப்பு தினுமலு விநிரா பெட்டி உஂபவலேமு.

எர பெட்டுட : எர பேயுடகே பரகம ஆஹர பதார்தாலலோனே 2 நுண்டி 3% ரேடாநிரு, பஂபதார, கார்ன் ஆயுலு ஒக்கொக்கடி 5% சேர்தி, அன்னி ஸ்தலாலலோனே ஒகேரிகா வாடவலேமு எர சேர்துன ஆஹரமுலனு பாகா தின்னட்ல 5-10 ஗்ரா எர இங்க உண்டே எர சேர்துன ஆஹரபதார்தமுலனு வாடவலேனு. ஒகே ஸ்தலமுலோ 2-4 வாரமுலலோபுனா எர பெட்டுராது. பப்பன எலுகலனு, முகுலு எரனு தீசி சுரடியலேனு.

முந்து ஜாக்ரத்துலு : மனுஷுலகு, பெம்புடு ஜந்துவுலகு தூரமுகா உஂபவலேமு ப்ரிஂகினவோ ப்ராணபாயமுன லேதா பாடி ஏல்புராது. ஆஹர பதார்தமுலகு, மேதலகு நொகபடியராது ஆட்டலகு, சிவிடே தாகுலபடியராது. இதி வந்யஜீவுலகு, பேபலகு ஹானிகரமைநதி. எரனு தினடு சுக்லுனு, இதர சஸ்யுஜீவுலு சுப்பம்பட்சுனு இதர பேட்டுக ப்ரக்டிஂகல பேட்டுக ப்ரக்டிஂகல பேட்டு வாடராது பரிகரால கடுகு நீவுதோனு, மகுலு மந்துதோனு நீவுனு கலுஷிதம சேயராது.

ப்ரதம சிகித்ச : ஜிஂன் ஃபாஸ்ஃபைட் வாடுதுன்ன வாரெனரெகீனா விகாரமு பாத்திகடுபு லேட்ட, வாதி பிரியுட பலீநாலதனுண்ட லக்ஷணா கநிபிஂபவலோ ஏண்டுக்கு ஜீயுரிகி மாஃபிஂபவலேனு, ப்ரிஂகினவோ 1-2 ஗்ராஸுல உப்பு நீவு ஏர்ராபவலநு. கொந்தலோநிகி சேல வாநிபுடு வாந்தி தெப்பிஂபவலேனு. எடுபவடி சுபேலா நாடராது. கோரின பகுமடபெட்டி பெப்புரா உஂபவலேனு. ஸ்புதிரேப்பின ரோகி வாந்தி தெப்பிஂபட, நோட் த்வாரா ஏமுனா இப்புட சேயராது. சர்மமுபைன, கண்ட்ரலோனு வடினவோ எக்குவ நீவுதோ கடுகுநவலேநு.

விலப பாரேத : சல்லநி பாடி ப்ரதேசமுலோ நிலப சேயவலேனு. நிலபோனு, பாரேதலோனு, நீதுனு, ஆஹர பதார்தமுலனு மேதலகு கலுஷிதம சேயராது, பயட கால்புசேயுட, சாரேயுட நிப்பிஂடுமு. ஖ாலி டப்பாலனு திரிகி நாடராது. முகுலு மந்து பதிநலகு நீடி பனுலகு தூரமுகா நிரபாயகரமைன ஸ்தலமுலோ பாதிபெட்டுவலேநு.

விரகுடு : காஃபீ லாரேஜ் த்வாரா விஷமுனு தீசிவேயவலேனு. வாந்திதெப்பிஂபஎட்ட 0.2% நீமுலு தூத்முமு வாடவச்சுனு. தினநல்ல வாந்தி வச்சுடயேகாக, கலுகின ப்ளாஸ்டிக் ஃபாஸ்ஃபைட் தயாரகுபடவேநு, தீனி ஈட்டு தர்வாத 1:5000 பாஸுசியம் பர்மாஂகனேட்டுதோ க்ஃபீக் லாவேஜ் சேசி தீசிவேயவச்சுனு. ஒக பௌன்சு மில்க் ஆஃ மெக்நீஷியாகானி லேதா 2-3 ஗்ரூட்ல தெல்ல சான கெலகொட்டீகானி இவ்வுபடுசுனு.

ரம உத்பாதன வாடகமு மா ஆதீனமுலோ லேபஂடுபட. தீனி வாடகமுலோ ஫லிஂபனல லேதா மனுமலகு ஜந்துவுலு வநிரோலகு ஜருகுகல ப்ரமாதமுலகு மேமேட்டி பாத்யதா லேமி ஂபமுலமு.

மார்க்கெடிஂக் சேயுவாரு : **ஸ்வால் கார்ப்பொரேஷன் லிமிடெட்,**
ரிஜிஸ்டர்டு கார்யாலயம்: யுபிஎல் லிமிடெட், ரெடீமனி டெர்ரஸ்,
167, டா. அநிபிஸெண்ட் ரோட், வர்லி, மும்பை-400 018, மஹாராஷ்ட்ரா.

ரேட் ஃப்ரீ

எலிகளுக்கு

ஸிங்க் பாஸ்ஃபைடு

உபயோகிப்பதற்கான வழிமுறைகள் : ரேடோல் லில் தீவிர மூலப்பொருளாய் ஸிங்க் நாஸ்ஃபைட்ட் அடங்கியுள்ளது. எலி, கண்டெலி போன்ற வயலை கொழிக்கும் பூச்சிகளுக்கும் தூண்டில் இரையாக கட்டிடங்களைச் சுற்றிலும் சமாங்களை கேமிக்கும் அறைகள், வயல்கள், பழத் தோட்டங்கள் மற்றும் இதர வெளி இடங்களுக்கும் வைப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அளவு :

உபயோகிப்பதற்கான காலவரை முறைகள்	பூச்சி ஆர்கனிஸம்	கொறிக்க வைப்பதன் தன் அளவு தீ.மு.பொ	டெக்னிகல்
1. வயலைக் கொறிக்கும் பூச்சிகளைக் 2. கட்டுப்படுத்த வசிக்குமிடங்களில் பயிற்சி பெற்ற எல்லுநர் மேற்பார்வையில் உபயோகிக்கப் படவேண்டும்.	ரேடஸ் ரேடஸ் ஆர்மெடொடா பேண்டிகோட்டா பெங்கலன்ஸிஸ் டாடேரா இண்டி தாமஸ் பூடாமஸ் ப்லடிதிரிக்ஸ் எம் மஸ்குலஸ் ரமரியா தெஸ் ஹரியான. ரேடஸ் தோள் விநிகிகள் ஸன்கள் கருளஸ்.	1.5 to 2.5	1.875 to 3.125%

மருந்தை வைக்க வேண்டிய இடத்தை தெரிந்தெடுத்தல் : முடிந்த அளவு உணவு, தண்ணீர் மற்றும் புகலிடங்களை நீக்கியப்பின் எலிகள், கண்டெலிகள் கொறிக்கும் பூச்சிகள் காணப்படும் உலர்ந்த அமிலமற்ற இடங்களை தீர்மானித்து வைத்தால் தூண்டில் இரையைத் தின்னும் பொதுவாக வரப்புகள் அல்லது சுவர்கள், பல்லால் கொத்திய பொந்துக்கள் வளையினுள் துளையின் பக்கத்தில் மூலைகளில் மறைவான இடங்களில் சுவற்றிற்கும் தரைக்கும் இடையே அல்லது எலிகள், கண்டெலிகள் நடமாட்ட அறிகுறிகள் தென்படும் இடங்கள் மருந்து வைக்க தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும்.

தூண்டில் இரை வைப்பதற்கு முன் : தூண்டில் இரை வைக்கப் போகும் இடங்களுக்கு அதிக வரவேற்பிற்காக மருந்து வைப்பதற்கு இரண்டு மூன்று தினங்களுக்கு முன்பு : 5-10 கிராம் 12 டீ ஸ்பூன்கள், மருந்து கலக்காத தானியங்கள் பருப்பு வகைகள் மற்றும் ரொட்டி போன்ற இதர உணவுப் பொருள்களைப் போடவும்.

தூண்டில் இரை : அதே போன்ற உணவுப் பொருட்களுடன் 5% சர்க்கரையும், 5% சோள எண்ணெயையும் சேர்த்து 2 விருந்து, 3% ரேட்டல் கலந்து தூண்டில் இரையைத் தயாரிக்கவும். தூண்டில் இரை எல்லாவற்றையும் ஒரே தடவையின் வைக்கலாம்.

தூண்டில் இரையைப்பதற்கு முன் வைத் மருந்து கலக்காத தானியங்களைத் தின்று விட்ட பகுதிகளில் மட்டும் 5-10 கிராம் தூண்டில் இரை வைக்கவும். ஒரு தடவை மட்டுமே வைக்கவும். 2-4 வாரங்களுக்குள் அதே இடத்தில் மருந்து வைக்காதீர்கள். இருந்தவற்றையும் மீதிசிய தூண்டில் இரையையும் அகற்றிவிடவும்.

முன்னெச்சரிக்கை அறிவிப்பு : மனிதர்களுக்கும் வீட்டுப் பிராணிகளுக்கும் வளர்ப்பு பிராணிகளுக்கும் அப்பால் வைக்கவும். உயிருக்கு ஆபாத்தாகவோ, கெடுதலாகவோ, சருமத்தில் படுவதைத் தவிர்க்கவும். தூக்கங்களை உட்சுவாசிக்காதீர்கள். உணவுப் பொருள்களிலோ, கால்நடைத் தீவனங்களிலோ மாசு ஏற்படுவதைத் தவர்க்கவும். இதர வன விலங்குகளும் இறந்து போகலாம். அடித்துச் செல்ல வாய்ப்புள்ள இடங்களில் உபயோகிக்காதீர்கள். மருந்து உபகரணங்களையோ உபரி பொருள்களையோ கழுவி தண்ணீரில் மாசு ஏற்படுத்தாதீர்கள்.

முதலுதவி : ஸிங்க் பாஸ்ஃபைடு உபயோகிப்பவருக்கு கும